

13

[O] Chinese

Vol X 111

V. 23 - V. 24

痔漏方凡五類

九漏第一 論一首 灸法十六首 方八十三首

論曰夫九漏之為病皆寒熱瘰癧在於頸腋者何氣使生此皆鼠瘻寒熱之毒氣提留於脈而不去者也鼠瘻之本皆根在於臟其末上出於頸腋之上其浮於脈中而未著於肌肉而外為膿血者易去去之奈何曰請從其末引其本可使衰去而絕其寒熱審按其道以予之徐往來以去之其小如麥者一刺知三刺已決其死生奈何曰反其目視其中有赤脈從上下貫瞳子見一脈一歲死見一脈半一歲半死見二脈二歲死見二脈半二歲半死見三脈三歲死赤脈不下貫瞳子者可治也○凡項邊腋下先作瘰癧者欲作漏也宜禁五辛酒麵及諸熱食凡漏有似石癰累累然作瘰癧子有核在兩頸及腋下不痛不熱治者皆鍊石散傅其外內服五香連翹湯下之 二方並見 卷癰疽門 已潰者治如癰法請漏結核未破者火鍼鍼使著核結中無不瘥者何謂九漏一曰狼漏二曰鼠漏三曰螻蛄漏四曰蠱漏五曰蚬蟬漏六曰蟬蟬漏七曰浮沮漏八曰瘰癧漏九曰轉脈漏

空青商陸散

治狼漏始發於頸腫無頭有根起於缺盆之上連延耳根腫大此得之憂患氣上不得下其根在肝 一作肺 空青主之商陸為之佐方 空青 蜎腦 各二 蜎肝 一具 商陸 獨活 黃芩 當歸

乾薑 婦人蓍草 蟹甲 蟹螯 地膽 茴香 礬石 各一 芎藭 半分 蜀椒 三十粒 右十六味治

下篩酒服方寸七日三服十五日服之

衍義

嘗讀內經僅有鼠瘻寒熱而無九漏之名詳推受病之源多由憂患所致屬於肝腎居多再參千金瘰癧一一定名何漏因於何病屬諸何臟言雖繁瑣不無砭砭混玉之疑如狼漏之毒根於肝而用空青商陸散首取空青利數通津佐以商陸利水導氣然在始病元氣未瀉者庶為合宜更取蜎腦

長洲張璐路玉衍義
南沙席世臣鄧客校

蝟腦入肝追毒蟹螯地膽攻堅破血礬石滌除腐穢一皆瞑眩之藥其餘歸苓獨蠶甲茴香椒薑之屬約雖稍平不過為空青等味之助力至用葶草其義未詳

狸骨知母散

治鼠漏始發於頸無頭尾如鼯鼠使人寒熱脫肉此得之食有鼠毒不去其根在胃以狸

骨主之知母為之佐方

狸骨

知母

桂心

鯪鯉甲

山龜殼

雄黃

甘草

乾薑等分

右

八味治下篩飲服方寸七日三仍以蜜和內瘡中無不瘥者先灸作瘡後以約傳之已作瘡不用灸

衍義

狸專捕鼠鼠漏用之每效故用狸骨佐以知母龜殼鯪鯉甲薑桂雄黃都是腎家辟除邪毒之藥

方下雖言其根在胃而後方之用鼠灰亂髮地黃膏傳並屬腎約恐是腎字之誤亦未可知以二字形頗相似也

治鼠漏方

用蛇虺所吞鼠燒末服方寸七日二不過三服此大有驗但難得耳并傳瘡中佳○又方

死鼠

形一枚中亂髮如彈子大一枚

右二味以臘月猪脂煎令消盡膏成分作二分一分稍稍塗瘡一分稍稍

酒服之瘥鼠子當從瘡中出良

地黃膏

治鼠漏瘡復發及不愈出膿血不止方

以不中水猪脂咬咀生地黃肉脂中令脂與地黃

相淹和煎六七沸其瘡先用桑灰汁洗去惡次以地黃膏傳上日一易

衍義

行義并見狸骨知母散內

桂子桔梗丸

治蜈蚣漏始發於頸項狀如腫此得之食瓜果實毒不去其根在大腸桂子王之桔梗為

之佐方

桂子

龍骨

各半附子一兩

蜀椒

百粒

桂心

桔梗

乾薑

礬石

獨活

各一分

右十味為末以棗二十枚合搗醋醬和丸如大豆溫醬下五九加至十丸

行義

桂子芳香通達肺氣佐以桔梗開提胸膈更兼椒薑桂附辛溫破結獨活羌窮祛風活血礬石

滌垢龍骨收津使不隨辛溫耗散深得散中寓斂之義

雄黃蒼散

治蜂漏始發於頸瘰癧三四處俱相連以漬此得之飲流水中有蜂毒不去其根在脾雄

黃蒼散

治蜂漏始發於頸瘰癧三四處俱相連以漬此得之飲流水中有蜂毒不去其根在脾雄

黃主之黃公為之佐方 雄黃 黃令融 蜂房 吳茱萸 乾薑 蜀椒 二 百 散 中 一 枚

石八味治下篩傳瘡口上日一度十日止

衍義 蜂漏用雄黃黃芩解毒清熱仍取蜂房助之其餘椒薑茵陳輔雄黃以破陰毒蟹甲輔黃芩以

泄旺氣此雖外治之方未嘗不可內服

礬石防風散 治蚘蟬漏始發於頸初得之如傷寒此得之食中有蚘蟬毒不去其根在腎礬石主之防

風為之佐方 礬石 防風 知母 雌黃 桃白皮 乾地黄 獨活 青黛 蟹螯 白芷 松

脂 附片 芍藥 海藻 當歸 白木 蠟皮 蜀椒 百粒 右十七味治下篩飲服一錢七日三

衍義 本經言礬石治寒熱鼠瘻死肌風痺腹中堅癰邪氣諸臟腑經絡無不達之佐以防風開泄風

熱其外諸味分解各經原不專主腎病若言得之食中未嘗不傷在胃亦未可確指蚘蟬也

礬石白木散 治蟻螬漏始發於頸下無頭尾如棗核塊累移在皮中使人寒熱心滿此得之喜怒哭泣

其根在心礬石主之白木為之佐方 礬石 白木 空青 當歸 細辛 一兩 蠟皮 蟹螯 枸

杞 地膽 各一 乾烏腦 豆許 右十味為末以醋醬服方寸七日三病在上側輸臥在下高枕以便藥

流下

衍義 礬石專除氣分之垢膩佐以白木專理氣分之津液餘皆散堅利數之品惟乾烏腦專於截風

然其病得之喜怒哭泣則肝與肺未必無預則不獨在心矣

地膽甘草散 治浮沮漏始發於頸如兩指使人寒熱欲臥此得之憂愁思慮其根在膽地膽主之甘草

為之佐方 地膽 雄黃 乾薑 續斷 石決明 菴闍根 龍膽草 各三分 甘草 一分 細辛 二分

衍義 本經言地膽治鬼疰寒熱鼠瘻惡瘡死肌破痂墮胎其破血辟毒之力最猛甘草之佐非助其

力解其毒耳其餘諸味雖寒熱錯雜不出解散之意以浮沮病不在裏僅用外敷足矣

雌黃黃丸

治瘰癧漏始發於頸有根初苦痛令人寒熱此得之因新沐濕結髮汗流於頭所致其根

在腎雌黃主之

藥為之佐方

雌黃 芍藥 茯苓 續斷 乾地黄 空青 礬石 乾薑 桔

梗 蜀椒 恆山 虎腎 狸肉 烏腦 蟹螯 礬石 附子 一兩

右十七味為末蜜丸如大

豆酒服十九日二

衍義

新沐中風則為首風新沐受溼溼著於腦則為瘰癧日久不散失其陽和蘊毒而成其漏故用

雌黃陰毒之物以破陰毒之結佐以芍藥除血痹破堅積此本經主治專取養營之功以和失調之血則痺自開積自散矣其餘虎腎狸肉烏腦蟹螯截風解毒礬石空青附子恆山破結開痰專賴芍藥以固陽根之力

蟹螯白芷丸

治轉脈漏始發於頸濯濯脈轉若驚惕身振寒熱此得之因驚臥失枕其根在小腸

蟹螯主之白芷為之佐方

蟹螯 白芷 綠青 大黃 升麻 鍾乳 甘草 防風 地膽

續斷 麝香 礬石 一人參 當歸 桂心 白木 麥冬 右十七味為末蜜丸如大豆

酒服十九日二勿食米慎房室百日

外臺無大黃桂心 麥冬 右十七味為末蜜丸如大豆

衍義 轉脈之漏因於驚臥失枕驚臥失枕有何大毒而用蟹螯地膽峻攻之味況有鍾乳白木之相

反大振格敵之威豈在白芷相佐之力歟其綠青與空青同出銅礦功專上涌風痰濟以礬石窮搜積

垢且得參朮補助其雄如虎斯翼故略借大黃以通下泄之機而為毒邪開一去路也於是再推致病

之由苟非別有所觸而蘊毒但需和血榮筋便可向安又何必竭厥從事於峻攻耶

治九漏方

空青 商陸 知母 狸骨 桔梗 防風 荏子 礬石 黃芩 白芷 芍藥 甘草

雌黃 白木 礬石 地膽 蟹螯 雄黃 等分

右十八味為末蜜丸如大豆以酢服三九三十

日知四十日愈六十日平復百日內慎房室

一方為散酢服一乃圭日二服老小減半

衍義

九漏者因寒定名因名定治上難瘰癧瘰癧第恐臨證致疑故又立統治諸法總以辟毒破堅

為務所用藥味不出上方未遑逐一觀覽

又方 蝟皮半枚 鮫魚甲樽雞一枚 鵝骨六分 蜥蜴 蜈蚣各一枚 蜀椒 附子 當歸 蜂房 桂心

地榆 通草 乾漆 牡丹皮 薏苡仁 疾藜子 漏蘆一作龍膽 龍骨一作土瓜 蟹螯四分

蛇牀子 苦參 大黃 蛇蛻皮 雄黃 蘭茹 細辛各二分 右二十八味為末酒服五分七以知

為度日一服 又方 蟹螯七枚 蝟皮 真珠 雄黃各等分 右四味治下篩酒服半錢七日三 又

方 成煉松脂填瘡孔滿日三四度七日瘡有神驗 又方 蟹螯一枚 雄黃 桂心 犀角各一兩

右四味為末酒服一錢七日二服痛從小便出 又方 馬齒莧陰乾 臘月燭燼等分 右二味為末

以臘月豬脂和其瘡先以暖泔清洗淨拭乾後以藥敷日三 又方 乾牛屎 乾人屎等分 右二

味搗先以綿褸瘡上綿上著屎蟲聞屎氣即出若瘡即以繇去之更別取屎及綿著其上如前蟲盡乃

止 又方 苦匏四枚大如盞者各穿一孔如指大置湯中者數沸取一竹筒長一尺一頭內匏孔中

一頭注瘡孔冷則易之

治一切漏方 蟹螯四十枚 鼓九枚 元青二十枚 生大豆黃 地膽各十枚 蜈蚣半寸 犀角 牛黃各一枚 右八

味為末蜜丸如梧子大飲服二丸須臾多作酸醬粥冷飲之病從小便出視尿盆中如有蟲形狀又似

膠汁乃病出也間日一服飲粥如常小弱者隔三四日候無蟲出瘡漸瘳持忌油膩一切器物皆須灰

洗乃作食崔氏云治九漏初服夜少食明日服二丸至七日甚虛問可煮食羹菜羹其餘脂膩 又方 煮鹽花以麵糠病上內鹽花麵匡中厚二寸其下以桑葉三重藉鹽候冷熱得所可忍冷則無

益則傷肉一日一度候瘳癰根株勢消則止若已作瘡者搗糝穀為末粉之 又方 槲北陰白皮三

十斤剉碎以水一石煮取一斗去滓煎如飴又取都廁上雄雌鼠屎各十四枚燒令汁為末內煎中又

溫酒一升投煎中合攪之羸人服半升富有蟲出 又方 霜下匏花曝乾為末傳之 又方 搗土

瓜根傳之燥則易不限時節 又方 死蛇去皮肉取骨為末合和封瘡上大痛以杏仁膏摩之痛止

卷之三

三

○又方 死蛇和臘月猪脂合燒為末內孔中○又方 燒死蜥蜴為末醋和塗之又死蛇灰醋和傳之○又方 故布裏鹽如彈丸大燒令赤為末酒服之○又方 服白馬屎汁一升○又方 猪脂一升酒五合煎沸頓服之○又方 水研杏仁服之○又方 鹽麵和燒灰傳之○又方 正月雄狐屎陰乾搗末水和服

治漏作瘡孔方 用露蜂房為末以臘月猪脂和傳孔中

治漏發心胸以下者方 松脂 武都雄黃_{兩各三} 右二味和為塊刀子刮為散飲服一方寸七日二不瘥更合

瘥更合

治漏方 鍛落鐵屑 狗頰車連齒骨_炙 虎屎 鹿皮_{帶毛為灰} 右四味等分治下篩以猪脂和內瘡中

須臾即易日五六度

治一切冷瘻方 用人所吐蛔蟲燒灰先用甘草湯洗去瘡惡然後著灰無不瘥慎口味

治鼠瘻腫核痛未成膿者方 以柏葉傳腫上熬鹽著葉上熨之令熱氣下即消

治風漏及鼠漏方 赤小豆 白斂 黃芪 牡蠣_{等分} 右四味為末酒服方寸七日三

治螻蛄瘻方 先以泔清煮柵葉取汁洗瘡拭乾次以柵葉灰內瘡中

治蜂漏方論 初生狀如桃而瘡搔之則引大如雞子如覆手者熬鹽燬之三宿四日不瘥至百日成瘻

其狀大如四五寸硬廣三寸中生蜂作孔乃有數百以石硫黃隨多少燃燒令汁出著瘡孔中須臾間

見蜂數十蜂盡乃瘥

治蜂瘻方 以人屎蛇蛻臘月猪膏和傳之○又方 鵝頭燒灰傳之○又方 取蜂窠燒灰臘月猪

脂和傳孔中

治蟻漏孔容鍼亦有三四孔者方 用蟬皮肝心燒灰為末酒服一錢七○又方 死蛇腹中鼠以臘月

猪脂煎候焦去滓傳之○又方 取大鼈鮓燒耕堡上令赤以苦酒浸堡上時合壁土故熱以黃鮓著

治瘰癧橫闊作頭狀若杏仁形亦作瘰癧方 雄雞糞燒灰臘月猪脂和封之
治蛇蟬漏方 用牛屎燒灰臘月猪脂和傳之○又方 蛇蟬丸即蟬所食之屎為末傳之○又方 乾牛屎
為末傳之瘰癧即撥却更厚封瘰癧乃止○又方 熱牛屎塗之數易應有蛇蟬出
治蛇蟬瘰癧方 雞屎 蛇蟬屎等分 右二味為末用壯猪下頷髓和傳之
治蝦蟆瘰癧方 用五月五日蛇頭及野猪脂同水衣封之
治蛇瘰癧方 用蛇蛻皮燒灰臘月猪脂和封之
治蛙瘰癧方 用蛇腹中蛙燒灰封之
治顛當瘰癧方 搗土瓜根傳瘰癧口味
治雀瘰癧方 取母猪屎燒灰臘月猪脂和傳上當有蟲出如雀形
治膿瘰癧方 以桃花為末猪脂和封之
治石瘰癧兩頭出者其狀堅實令人寒熱方 以大鉞鉞破之次用鼠粘葉二分為末和雞子白一枚封之
○又方 搗槐子和井花水封之○又方 搗生商陸根捻作餅子如錢大厚三分安漏上以艾炙餅
上乾易之灸三四升艾瘰癧外臺灸瘰癧○又方 七月七日日未出時取麻花五月五日取艾等分合搗作
炷用灸瘰癧上百壯外臺灸瘰癧

灸法

九漏灸肩井二百壯 漏灸鳩尾骨下宛宛中七十壯 諸漏灸瘰癧周圍四畔瘰癧 諸惡漏中冷息肉灸
足內踝上各三壯二年六壯 寒熱胸滿頸痛四肢不舉腋下腫上氣胸中有音喉中鳴天池主之

寒熱頸腫後谿主之 寒熱酸瘡痛四肢不舉腋下腫馬刀瘻喉痹脾膝胫骨搖酸痺不仁陽輔主

之 寒熱頸腋下腫申脈主之 胸中滿腋下腫馬刀瘻善自嚙舌頰天牖中腫寒熱胸脇腰膝外廉

痛臨泣主之 寒熱頸腫丘墟主之 腋下腫馬刀肩腫吻傷太衝主之 寒熱頸瘰癧大迎主之

五白骨 治鼠漏及瘰癧方 白牛皮 白馬屎 白猪屎 白羊屎 白雞屎格一 漏蘆二斤 右六味各

于石上燒作灰研篩以猪膏一升三合煎亂髮一兩半令極沸盡消乃內諸末微火上煎五六沸約成

去瘡痂以鹽湯洗淨帛拭乾傅此膏若無痂亦須湯洗日再敷若著骨當以帛裹上勿令中風冷神驗

曾青散 治寒熱瘰癧及鼠瘻方 曾青 桂子 礬石一作附子 各半 枯蔓根 露蜂房 當歸 防

風 芍藥 黃芪 黃芩 狸骨 甘草各二兩 細辛 乾薑各一兩 斑貓 蜺青各五枚 右十七味治下

篩酒服一方寸七日再○又方 治寒熱瘰癧方 土瓜根 連翹 龍膽 黃連 枯蔓根 苦參

芍藥 恒山各一兩 右八味為末酒服五分七日三翼方及外臺有狸骨一枚翼

薑薇丸 治身體有熱瘰癧及常有細瘡并口中生瘡方 薑薇根三兩 黃芪 鼠李根皮 枯

蔓根 芍藥 苦參 石龍芮 防風一作白斂 龍胆各一兩 梔子仁四兩 右十二味為末蜜丸如

梧子大飲服十五丸日再翼方有黃

治瘰癧方 用白蠟蠶治下篩水服五分七日三服十日瘥○又方 狸頭一枚炙搗篩飲服方寸七日

二○又方 故履內蠶替燒末五七和酒一升平旦內日服之強行須臾吐鼠出三朝服○又方 狸

頭蹄骨等炙黃搗篩為散飲服一錢七日再○又方 貓兩眼陰乾燒灰并花水服方寸七日再○又

方 乾貓舌為末傅瘡上○又方 狼屎灰傅之○又方 狐頭狸頭灰傅之○又方 五月五日取

一切種種雜草煮取汁洗之○又方 貓腦 莽草等分 右二味為末著瘰孔中

灸漏方 葶藶子一合 豉一升 右二味味和搗令極熟作餅子如大錢厚二分許取一枚當瘡孔上作

大艾炷如小指大炙餅上三炷一易三餅九炷隔三日復一灸外臺灸瘰癧古今錄驗云不

可灸頭瘰癧瘰癧入腦殺人

蘇大小貼癰子灸之勿令上破肉但取熱而已七壯一易蒜日日灸之取消止一切癰瘰癧兩膈裏患癰處宛宛中日一壯七日止神驗 又灸五里人迎各三十壯 又灸耳後髮際直脈七壯 又灸患人背兩邊腋後文上隨年壯

衍義

治九漏方已下至此凡六十餘方方無大小一類次靡遺所謂牛溲馬勃皆可收之藥籠也

腸癰第二論三首 灸法二首 方二十九首

論曰卒得腸癰而不曉其病候愚醫治之錯則殺人腸癰之為病小腹重而強抑之則痛小便數以淋時汗出復惡寒其身皮皆甲錯腹皮急如腫狀其脈數者小有膿也巢氏病源云數其脈遲緊者未有膿也甚者腹脹大轉側聞水聲或遠膺生瘡或膿從膺中出或大便出膿血問曰官羽林婦病醫脈之何以知婦人腸中有膿為下之即愈師曰寸口脈滑而數滑則為實數則為熱滑則為榮數則為衛衛數下降榮滑上升榮衛相干血為濁敗小腹痞堅小便或澀或復汗出或復惡寒膿為已成設脈遲緊即為瘀血血下則愈

大黃牡丹湯 大黃四兩 牡丹三兩 芒硝二兩 瓜子一升 桃仁五十粒 右五味咬咀以水五升煮取一升

頓服當下膿血金匱方用牡丹一兩瓜子半升芒硝二合 刺瘻方用小子半升芒硝半合調滑子用硝汗出其脈遲堅者未成膿可下之當有湯

腸癰湯方 牡丹 甘草 敗醬 生薑 茯苓 各二 桔梗 薏苡仁 麥門冬 各三 丹參 芍藥 各四

生地黄 五兩 右十一味咬咀以水一斗煮取三升分三服日三〇又方 薏苡仁 一升 牡丹 桃仁

各三 瓜瓣 二升 右四味咬咀以水六升煮取二升分二服 桃仁 不用 桃仁 用杏仁 崔氏有芒硝下

凡腸癰其狀兩耳輪文理甲錯初患腹中苦痛或繞臍有瘡如粟皮熱便膿血出似赤白下不治必死方

飲食小便利此病多是腸癰人多不識婦人產後虛熱者多是此証總非癰疽但是便服此方無傷損也

凡腸癰其狀兩耳輪文理甲錯初患腹中苦痛或繞臍有瘡如粟皮熱便膿血出似赤白下不治必死方

凡腸癰其狀兩耳輪文理甲錯初患腹中苦痛或繞臍有瘡如粟皮熱便膿血出似赤白下不治必死方

凡腸癰其狀兩耳輪文理甲錯初患腹中苦痛或繞臍有瘡如粟皮熱便膿血出似赤白下不治必死方

以馬蹄灰雞子白和塗即拔毒氣不過再塗瘡○又方 以瓜子三升搗末水三升煮取一升半分
三服○又方 以馬牙燒灰雞子白和塗乾即易

衍義

內癰癰證不早每多誤治之失嘗攷金匱大黃牡丹湯與千金無異者取大黃下瘀血閉壯

丹治瘀血留舍芒硝治五臟積熱滌去蓄結推陳致新之功較大黃尤銳桃仁治疝瘕邪氣下瘀血
閉之功亦與大黃不異甜瓜瓣別錄治腹內結聚成清膿血專於開痰利氣為內癰脹遲緊膿未成之
專藥 其後腸癰湯二方即金匱意以附子敗醬散之變方以治膿成膿數不可下之證金匱意以
十分附子二分敗醬五分千金慮附子助熱易以牡丹又因敗醬難覓易以瓜瓣更加前方中桃仁以
助牡丹之力又以小方之力雖專不若大方兼培津血故特立腸癰湯方已潰可以排膿未潰可以解
毒良工苦心無以過之其餘丹方如馬蹄灰和雞子塗則有散血之功馬牙灰和雞子塗則有拔毒之
用單服瓜瓣湯則有開痰利導之益故并存之

灸腸癰方

屈兩肘正灸肘頭銳骨各百壯則下膿血即瘥

論曰產後宜勤擠乳不宜令汁蓄積蓄積不去便結不復出惡汁於內引熱溫壯結堅掌型痛大渴引飲
乳急痛手不得近成如乳非癰也急灸兩手魚際各二十七壯斷癰脈也不復惡手近乳汁亦自出便可
手助近持之則乳汁大出皆如膿狀內服連翹湯外以小豆薄塗之便瘥 婦人女子乳頭生小淺熱瘡
搔之黃汁出浸淫為長百種治不瘥者動經年月名為如乳婦人飲兒者乳皆欲斷世謂前抄乳是也宜
以赤龍皮湯及天麻湯洗之傅二物飛鳥膏及飛鳥散佳若始作者可敷黃芩漏蘆散及黃連胡粉散並
佳

赤龍皮湯方

槲皮切三升以水一斗煮取五升夏冷用之冬溫用之分洗乳亦洗諸敗爛久瘡洗竟傅

膏散

天麻湯方

用天麻草切五升以水一斗半煮取一斗隨寒熱分洗乳以殺瘡也此草葉如麻冬生夏著

飛鳥膏方 傾粉見燒砂作水銀粉 礬石各三 右二味為末以甲煎和如脂傳乳瘡日三傳之作散者不須和汁自著者可用散其諸熱瘡黃爛瘡浸淫汁瘡丈夫陰蝕瘡淫瘡小兒頭瘡月蝕口邊肥瘡癰瘡等並皆主之

黃連胡粉散 黃連二兩 胡粉二兩 水銀一兩 右三味為末相和與皮裏熟按之自能和合縱不得成

一家亦得水銀細散入粉中也以傳乳瘡諸淫瘡黃爛肥瘡等若乾者甲煎為膏

治如乳乳生瘡方 蜂房 猪甲中土 車轍中土各等 右三味為末苦酒和傅之

鹿角散 治婦人乳生瘡頭汁出疼痛不可忍者方 鹿角二分 甘草一分 右二味治下篩和以雞子

黃於銅器中置溫處灸上傅之日再即愈

治如乳方 以葵莖灰搗歸飲服方寸七日三即愈集驗方直搗為散不為灰 又方 燒自死蛇為灰以猪脂和塗

大良

行義 婦人經斷則有軀生育則乳子乳母有故則乳汁蓄積不出壯熱結痛便宜服連翹湯分利其

熱外用赤龍皮湯及天麻草湯洗之飛鳥膏專祛膿垢黃連胡粉散兼收溼熱蜂房二王杜風解毒鹿角甘草散熱行血葵莖利竅通津蛇灰截風拔毒皆乳患小方之可採用者也

灸法 以蒲橫度口以度從乳上行灸度頭二七壯

論曰產後不自飲兒并失兒無兒飲乳乳蓄結癰不飲兒令乳上腫者以雞子白和小豆散傅乳房令消結也若飲兒不泄者數捻去之亦可令大孩子含水使口中令為啣取滯乳汁吐去之不含水漱去熱喜令乳頭作瘡乳孔塞也 凡婦人多患乳癰年四十已下治之多瘥年五十已上慎勿治治之多死不治自得終天年

連翹湯 治如乳乳癰方 連翹 芒硝各二 芍藥 射干 升麻 防已 杏仁 黃芩 大黃 柴

胡甘草^{兩三} 右十一味咬咀以水九升煮取二升五合分三服

行義 妒乳乳癰總以清熱利竅解毒為主連翹治癰腫惡瘡甘草治臟腑邪氣黃芩治惡瘡疽蝕

藥治血痺止痛射干治胸中結氣杏仁治產乳金瘡升麻治風腫諸毒柴胡治腸胃結氣防已行通十

二經大黃下瘀血血閉芒硝破五臟積熱上下宣通而乳癰解矣

治乳癰方 麥門冬一升黃芩芍藥茯苓^{各二兩}桑寄生人參黃芪防風甘草^{各三兩}粘糖^{八兩}大棗^{五枚} 右十一味咬咀以水一斗煮取三升去滓內糖一沸分四服

行義 連翹湯治乳癰全盛之實故用硝黃此方治乳癰潰後之虛故用參芪佐以苓防兼清風熱助

以東糖專資津氣門冬清膈上之熱茯苓調心下之虛芍藥和血斂陰寄生去風逐溼甘草治五臟六

腑寒熱邪氣也

又方 先服前湯五日後服此丸即愈方 天門冬^{五兩}澤蘭^{五分}大黃^{十分}升麻^{六分}羌活桑寄生

防風人參黃芪乾地黃白芷通草^{各二兩}黃芩枳實五味子茯苓天雄芍藥

當歸^{各一兩} 右十九味為末蜜丸酒服二十丸日二加至四十丸

行義 乳癰服湯不瘥元氣漸衰邪毒愈熾以故補瀉兼施益以天雄嚔通乳數蜜丸酒服緩行諸藥

之力 治乳癰始作方 廣濟方云治乳癰大堅硬赤 大黃 芍藥 馬蹄^{各等} 右四味治下篩飲服方

寸七取汗出瘥 廣濟方云瘡處不可忍者 大黃 芍藥 馬蹄^{各等} 右四味治下篩飲服方

行義 乳癰始作勢在壅攻故用棟黃佐大黃導溼熱下走芍藥助馬蹄以斂津使不隨毒邪散漫也

又方 黃芩白斂芍藥^{等分} 右三味為末以漿水飲服半錢日七三若左乳汁結者即將去右乳

汁若右乳汁結者可將去左乳汁 治乳云 黃芩清風熱白斂散結腫芍藥和營氣服用漿水以斂傷殘之氣

行義 黃芩清風熱白斂散結腫芍藥和營氣服用漿水以斂傷殘之氣

又方 鹿角治下篩以猪脂上清汁服方寸匕不過再服亦可醋漿水服

行義

鹿角生坐為末服取其消腫散血乳癰用之最捷

痰黎丸

治婦人乳腫痛方

痰黎子

大黃

一敗醬

三分

薏苡仁

桂心

人參

附子

黃芪

黃連

雞骨

當歸

黃連

雞骨

當歸

芍藥

枳實

通草

右十四味

為末蜜丸

如梧子大

未食飲服

三九不

知

益至五九日

三無所忌

一方無大黃敗醬黃連通草為散酒服方寸匕

行義

方用大黃黃連解熱桂心附子散結人參黃芪固本當歸芍藥和營敗醬意以敗膿枳實通草

利竅尤賴痰黎破除惡血雞骨引入厥陰也

排膿散

治乳癰除惡肉方

茯苓

鐵精

桂心

細辛

黃芩

芍藥

人參

防已

一作當歸

乾薑

甘草

五分

右十一味

治下篩酒服方寸匕

七日三夜

一服約十日

膿血出多勿怪

○又方

生地黄

三升

芒硝

三合

鼓一升

右三味

含搗傅上熱即易之取瘡止一切癰腫皆用之

一方單用

地黃傳之

行義

乳癰潰久不愈元氣大傷血氣凝滯致生惡肉故用茯苓歸芍人參甘草護持元氣細辛桂心

乾薑溫理伏邪防已通行經脈鐵精鎮攝虛火黃芩清解風熱并緩薑桂之性庶不隨膿外脫外用地

黃芒硝香鼓傳之惡肉可漸化矣

治乳癰方

大黃

鼠屎

新者各一分

黃連

二分

右三味

為末以黍米粥清和傅乳四圍痛止即愈無黍米

即粟米粳米亦可

○又方

大黃

莽草

生薑

右四味

搗為末以酢和塗乳痛

即止

行義

大黃黃連辟除毒熱鼠屎通厥陰經為乳癰之的藥

又方以大黃消腫熱莽草祛風毒生薑

消脹滴伏龍肝和營血醋和塗乳取其酸收即漿水服散之義

又方

取葱白搗傅之并絞汁一升頓服即愈

又方

取葱白搗傅之并絞汁一升頓服即愈

又方

取葱白搗傅之并絞汁一升頓服即愈

又方

取葱白搗傅之并絞汁一升頓服即愈

又方

取葱白搗傅之并絞汁一升頓服即愈

又方

取葱白搗傅之并絞汁一升頓服即愈

又方

取葱白搗傅之并絞汁一升頓服即愈

又方

取葱白搗傅之并絞汁一升頓服即愈

又方

又方

取葱白搗傅之并絞汁一升頓服即愈

又方

取葱白搗傅之并絞汁一升頓服即愈

又方

取葱白搗傅之并絞汁一升頓服即愈

又方

取葱白搗傅之并絞汁一升頓服即愈

又方

取葱白搗傅之并絞汁一升頓服即愈

又方

取葱白搗傅之并絞汁一升頓服即愈

又方

取葱白搗傅之并絞汁一升頓服即愈

又方

又方

取葱白搗傅之并絞汁一升頓服即愈

又方

取葱白搗傅之并絞汁一升頓服即愈

又方

取葱白搗傅之并絞汁一升頓服即愈

又方

取葱白搗傅之并絞汁一升頓服即愈

又方

取葱白搗傅之并絞汁一升頓服即愈

又方

取葱白搗傅之并絞汁一升頓服即愈

又方

取葱白搗傅之并絞汁一升頓服即愈

又方

又方

取葱白搗傅之并絞汁一升頓服即愈

又方

取葱白搗傅之并絞汁一升頓服即愈

又方

取葱白搗傅之并絞汁一升頓服即愈

又方

取葱白搗傅之并絞汁一升頓服即愈

又方

取葱白搗傅之并絞汁一升頓服即愈

又方

取葱白搗傅之并絞汁一升頓服即愈

又方

取葱白搗傅之并絞汁一升頓服即愈

又方

治乳癰二三百日膿瘰不瘥但堅紫色青柳根熨方 以柳根削取上皮搗令熟熬令溫盛者練囊中熨

乳上乾則易之一宿即愈

治妒乳乳癰腫方 取研米槌二枚炙令熱以絮及故帛揄乳上以槌更互熨之瘥止已用立效

治乳癰堅方 以水罐中盛醋泔清燒石令熱內中沸止更燒如前少熱內乳漬之及冷更燒石內漬不

過三度燒石愈

〔衍義〕葱白搗傳取其通竅 柳根溫熨取其解毒 焙槌熱熨取其溫散 醋泔溫漬取其酸斂各

有妙用鄉村無約處宜之

五痔第三 論一首 方二十六首

論曰夫五痔者一曰牡痔二曰牝痔三曰脈痔四曰腸痔五曰血痔牡痔者肛邊如鼠乳時時潰膿血出

牝痔者肛腫痛生瘡脈痔者肛邊有瘡癢痛腸痔者肛邊核痛發寒熱血痔者大便圓血隨大便汚衣又

五痔有氣痔寒濕勞淫即發蛇蛻皮主之牡痔生肉如鼠乳在孔中頗出見外妨於更衣蠶甲主之牝痔

巢驗作酒痔 從孔中起外腫五六日自潰出膿血蛻皮主之腸痔更衣提出久乃縮母指左足懸蹄甲主之脈

痔更衣出清血蜂房主之五約皆下篩等分隨其病倍其主約為三分旦以井花水服半方寸七病甚者

旦暮服之亦可四五服禁寒冷食猪肉生魚菜房室惟食乾白肉病瘥之後百日乃可通房內又用約導

下部有瘡內約瘡中無瘡內孔中又用野葛燒末刀圭內藥中服藥五月知二十日若三十日愈痔痛通

忌葷菜

〔衍義〕痔漏皆由溼熱所致故昔人嘗以雨過溼蒸生困譬之千金首取血肉之物分治五痔獨不及

血痔者以散血之藥頗多如犀角馬蹄牛腮蝨廬之屬皆可取用又以野葛燒灰略入劑中者專取毒

方之性以攻贅疣獨葷菜為痔家切禁者惡其傷殘陽氣而乏長養之功也

治五痔瘰醫所不能愈者方 秦艽 白芷 厚朴 紫參 亂髮 紫苑 雷丸 藥本 石南

腹飲下十五丸日二若劇者夜一服四日肛邊瘡止八日膿血盡鼠乳悉瘳滿六十日終身不復發久服益善忌魚猪肉等

行義 草根木實之可以辟除溼熱者痔家恒取用之如秦光白芷藁本紫參皆風熱藥紫參實最厚朴雷丸散結滯藥亂髮猪蹄蟲麝破積血藥獨石南一味為腎家風藥腎主二便特取以祛下焦風毒也

槐子散 治燥溼痔痔有雄雌皆主之方 槐子 乾漆 秦光 吳茱萸根白皮各四兩 白芷 桂心 黃

芩 黃芪 白斂 牡蠣 龍骨 雷丸 丁香 木香 蒺藜子 附子各二兩 右十六味為末蜜丸如

梧子大飲服二十九日三千金翼無白斂深師無黃芪云治若果有乾燥腫痛者有崩血無數者有鼠乳附核者有腸中煩癢者三五年皆殺人主忌飲酒及作勞犯之即發

行義 方中蒺藜白芷秦光黃芩祛除風氣槐子白斂清解毒邪二香桂附吳茱萸根溫散結滯乾漆

雷丸攻逐瘀血牡蠣龍骨黃芪收斂津氣以其寒熱間錯氣血交攻斂散並列故壯痔疝痔瘰痔血痔

乾痔溼痔咸可治之

小槐實丸 治五痔十年者方 槐子三斤 白糖二斤 礬石 硫黃各一兩 大黃 乾漆 龍骨各十兩 石

七味以四味搗篩其二種石細切及糖內銅器中一石米下蒸之以綿絞取汁和藥末併手丸如梧子

大陰乾酒服二十九日三稍增至三十丸

行義 味雖略減而寒熱斂散血氣之藥靡不畢具不同蜂蜜而用飴糖者取其專滋穀藏也

槐子酒 治同前 槐子二斗 槐東南枝細剉 槐東南根細剉 右三味內大釜中以十六斛水煮取五

斛澄取清更煎取一石六斗炊兩斛黍米上餵二十斤釀之攪令調封泥七日酒熟取清飲適性常令

小小醉合時更取淳煮取汁淘米及洗痔不得用水忌生水故也

行義 槐乃虛宿之精寒而不滑兼取三槐益腎清火為痔家之專藥惟中氣虛寒慎用

又方 塗熊胆取瘰止神良一切方皆不及此○又方 七月七日多採槐子熟搗取汁內銅器中重

密蓋著宅中高門上曝二十日已上煎成如鼠屎大內穀道中日三亦主瘰及百種瘡○又方 取生

槐白皮十兩熟搗丸如彈丸綿裹內下部中此病宜常食扁竹葉及煮羹粥大佳○又方 取鯉魚腸

三具以火炙令香縣裏內穀道一食久蟲當出食魚腸數數易之盡三具瘡○一方炙腸令香坐上蟲

出經用有效○又方 虎頭犀角 右二味為末和不中水猪脂大如雞子塗瘡上取瘡

治五痔及脫肛方 槐白皮 二兩猪脂 半斤 棗子 桃仁 各十枚 巴豆 七粒 蔓草 一作辛夷 白芷 甘草

各半 野葛 六銖 右十味咬咀煎三上三下去滓以綿沾膏塞孔中日四五過蟲死瘰止瘡痛大佳

治五痔方 猬皮 方三指 薰黃 大如雞子 熟艾 子大 右三味穿地作孔調和取便熏之口中熏黃烟氣為佳

火氣消盡即停停三日將息更熏之凡三度永瘰勿犯風冷羹臠將補慎猪雞等○又方 取槐根煮

洗之○又方 用桃根煮洗之 熊膽辟垢清熱 槐子解毒滋腎 槐皮解熱散溼 鯉魚腸利水引蟲 虎頭犀角追風散

血 治五痔方散瘰祛毒 猬皮三味重痔透毒 槐根取其化蜜 桃根取其散血皆外治法也

蠅皮丸 治痔方 亦治 蠅皮 一具 礬石 當歸 連翹 乾薑 附子 續斷 黃芪 略二 槐子 三兩

乾地黄 五兩 右十味為末蜜丸如梧子大飲服十五丸日再加至四十九丸 集驗方無 礬石地黃

〔衍義〕 痔漏經久氣血凝滯故用薑附溫散結滯歸芪續地調和血氣連翹槐子清解熱邪以助蠅皮

礬石滌除毒垢之力 又方 治崩中及痔方 蠅皮 人參 茯苓 白芪 禹餘糧 乾地黄 槐耳 續斷 各三 蒲黃

黃芪 當歸 艾葉 橘皮 白斂 甘草 略三 白馬蹄 酒浸一 牛角 各四 鰻鱧魚頭 枚二十 猪懸蹄

甲二枚 右十九味為末蜜丸如梧子大酒服二十九日再稍加

甲二枚 右十九味為末蜜丸如梧子大酒服二十九日再稍加

衍義

此以患久氣血侵衰故用參芪佐蠅皮猪蹄甲辟除積垢鰻頭滋化蟲毒馬蹄牛觶散癰

毒故可兼治崩中下血

治痔方

槐耳赤雞二斤

即槐

為末飲服方寸七日三

○又方

蒲黃水服方寸七日三

外臺云治痔每大便常有血

者

○又方

桑耳作羹空腹飽食之三日食佳

治痔下血及新產漏下方

附子

礬石

各一兩

右二味為末白蜜丸如梧子大酒服二九日三稍加不

過數日便斷百日服之終身不發

崔氏方有乾薑一兩

衍義

槐耳清熱

蒲黃散瘀

桑耳止血上皆正治之法

附子礬石專除積垢此則從治之方隨

新久微其調之

治外痔方

亦治惡瘡

真珠

雄黃

雌黃

各一兩

竹茹

猪骨

一斤

右五味為末內猪膏中和調又切

亂髮半雞子大和東白煎三上三下髮焦出其痔先用鹽湯洗拭乾後傳之

治痔下部出膿血有蟲傍生孔竅方

以槐白皮一擔剉內釜中煮令味極出置大盆中適寒溫坐其中

如浴狀蟲悉出冷又易之不二三度瘥

治穀道瘡痛緣腫起裏許欲生肉突出方

大豆

三升以水七升急火煮取四升

槐白皮

三升

甘草

三兩

右三味以豆

汁煮取二升浸故帛薄之冷則易日三五度

槐皮膏

治穀道瘡痛痔瘡方

槐皮

棟實

各五兩

白芷

二兩

當歸

三兩

桃仁

六十枚

甘草

一兩

豆二合

右七味咬咀以成煎猪膏一斤微火煎白芷色黃膏成取摩瘡上日再并導下部

虛或酒醉當風所損腎臟病所為肛門腫生瘡因酒勞傷發為清血肛門疼痛痔瘡

治穀道痛方

兔絲子熬黃黑和雞子黃傅之日二度○又方杏仁熬令黃搗作脂傅之

治大便孔卒痛如鳥啄方大小豆各一斗和搗內二袋中蒸令極熟更豆坐之瘥

衍義

真珠二黃亂髮竹茹化毒散血

槐皮滌蟲

兼大豆甘草化毒

槐皮膏解毒和血兼化蟲

可 兔絲去風續傷 杏仁殺蟲解毒 黑豆大小皆能解腎經毒蒸熱坐之專收溼熱

灸法

久冷五痔灸并中百壯 五痔使血失屎灸回氣百壯穴在脊窮骨上

疥癬第四論二首 方六十七首

論曰凡瘡疥小秦尤散中加烏蛇肉二兩主之黃芪酒中加烏蛇脯一尺亦大效千金翼云黃芪酒中加

羊石南并草各等分大秦尤散中加之亦大效小 凡諸疥癬皆用水銀猪脂研令極細塗之

治凡有瘡疥腰膀手足皆生疵疥者方 枯蘗根四兩 薔薇根各一 雀李根皮 黃連 黃柏 芍藥各三

黃芪 黃芩 當歸 苦參 石龍芮各二 大黃 續斷各一 右十三味為末蜜凡如梧子以薔薇

飲服二十九日三加之三十九日瘡乃止若乾疥白癬勿服千金翼云癰疽皆可服之

治寒熱瘡及風疥諸雜瘡方 並根 礬石 雄黃 藜蘆 瓜蒂 胡粉各一 水銀三分 右七味以

柳木研水銀使盡用猪脂一升煮藜蘆並根瓜蒂三沸去滓內諸藥和調令相得即成以傅之神良

方以此用治癰瘡

蘭茹膏 治一切惡瘡疥癬疽漏瘍方 蘭茹 狼牙 青箱 地榆 藜蘆 當歸 扁蓄 羊蹄根

兩 蛇牀子 白斂各六 漏蘆二分 右十一味搗以苦酒漬一宿明旦以成煎猪膏四升煎之三上

三下膏成絞去滓內後藥如左 雄黃 雌黃 硫黃 礬石 胡粉 松脂各二 水銀三兩 右七

味細研看水銀散盡即傾煎膏中以筋十雙攪數百遍止用磁器密貯令勿洩氣煎膏法取微火熬急

則不中用傳約不可近眼及陰先研雄黃等令細俟膏小冷即和攪傅之

治疥疽諸瘡方 水銀 胡粉各六 黃連 黃柏各八 薑黃十分 礬石 附子 蛇牀 苦參各三 右

九味水銀胡粉別研如泥餘為末以成煎猪骨合和研令調傅之黃方無薑黃

治久疥癬方 丹砂 雄黃 雌黃 劉蛩 亂髮 洗淨 松脂 白蜜 耶蘭茹 三兩 猪脂 二升 巴豆各四

右九味先煎髮令消盡內松脂白蜜三上三下去滓內諸末更一沸止傳之不用蜜○又方 礬石礬石一作苗連蛇牀子各一 右四味為末以猪脂七合和攪不見水銀為熟傳之 一方加藜蘆一兩又云蘭茹

治諸瘡疥癬久不瘥者方 水銀一斤 臘月猪脂五斤 右二味以鐵器中疊電用馬通熬七日七夜勿

住火出之停令取膏去水銀不妨別用以膏傳一切瘡無不應手立瘥千金翼用水銀粉和猪脂塗之○又方 特牛屎 羊蹄根各五 右二味以牛屎漬羊蹄根一宿日曝乾腹內尿中取盡止作末傳諸瘡和猪脂用

○又方 拔取生鳥頭十枚切煮汁洗之瘥

論曰凡諸瘡癬初生時或始痛癢即以種種單方救之或礬鹽塗之又以穀汁傳之又以蒜墨和傳之

以蒜一作蒜又以薑黃傳之又以鯉魚鮓糝傳之又以牛李子汁傳之若以此救不瘥乃以前諸大方治之

治細癬方 蛇牀子 白鹽一作白鹽 羊蹄根各一 赤葛根 苦參 菖蒲各半 黃連 莽草各三 右八味

以咀以水七升煮取三升適寒溫洗身如炊一石米頃為佳澄清後當微溫用之滿三日止○又方

以羊蹄根於石上苦酒磨傳之欲傳先刮瘡以火炙乾後傳四五遍其方云搗羊蹄根著磁器中以白

和塗之若瘡處不傷即不瘥○又方 羊蹄根五升以柔柴灰汁煮四五沸以洗之凡方中用羊蹄

根皆以日未出時採之佳○又方 葛蒲末五斤以酒五升漬金中蒸之使味出先絕酒一日每服一

升或半升○又方 乾荊子燒中央以器承兩頭取汁刮瘡令傷塗之

治癬方 取煎餅熟搗不限多少日一遍良亦治浸淫瘡○又方 淨洗瘡取醬餅雀屎和傳之瘥止

云取醬和○又方 水銀無美和酥塗之○又方 日中午搗桃葉汁傳之○又方 搗刺刺汁傳并

服之○又方 燒蛇蛻一具酒調服之○又方 服地黃汁佳○又方 服鹽尿良○又方 搗羊蹄

根和乳塗之○又方 醋煮艾塗之○又方 搗良若根蜜和傳之其方無根字

治濕癬肥瘡方 用大麻諸傳之五日瘥

治癰久不瘥者方 取自死蛇燒作灰以猪脂和塗即瘥

治小兒癰方 以蛇牀子搗末猪脂和傅之

治瘡瘻方 以水銀和胡粉傅之

行義

夫仁人之用心也並及一切巨細靡遺如疥癬之溼熱外淫其毒未嘗不根諸於裏然內治頗難獲效故以水銀胡粉之屬為外治之所必需其間如骨取草約熬汁以和石葯為外傅之首推其餘諸方無論大小不出祛溼殺蟲解毒諸法也

治身體瘡癢白如癰狀者方

猪子三枚 猪脰一具 鹽一升 礬石一兩

右四味以苦酒一升合搗令熟

拭身日三

治癰瘍方

以三年醋磨烏賊骨先以布拭肉令赤傅之○又方

醋磨硫黃傅上

集驗方磨硫黃附子使熟將附子布拭病

上乃以

○又方 取蛇蟬搗爛塗之膏指令熱封上一宿瘥○又方

白斂

薰陸香

右二味為

末指上并水服之○又方

硫黃

雌黃

槲皮煨等

蛇蛻一具

右四味搗篩以清油合和薄塗白

處欲塗時先以巴豆半截拭白處皮微破然後傅之不過三兩度○又方

硫黃

水銀

礬石

竈

墨等分 右四味搗末內蚰子中以葱涕和研臨卧傅病上

行義

風毒襲於氣分血不榮於肌膚而成瘡瘻者白癰風也方用栝實入腎祛風猪脰礬石辟除穢

毒 烏賊骨散血脈中風 石硫黃破陰邪毒 蛇蟬拔毒消腫 白斂乳香解毒散結 硫黃雌黃

槲皮蛇蛻巴豆指傳破毒殺蟲 硫黃水銀礬石突墨葱涕調傅滌垢化蟲皆白癰風外治之法

九江散 治白癰風及二百六十種大風方

當歸七分

石南六分

附子

躑躅

秦艽

菊花

乾薑

防風

雄黃

丹砂

麝香

蠶蠶各十

蜀椒

連翹

鬼前羽各一

石長身

知母各八

鬼白十一

分人參

王不留行

石斛

天雄

烏頭

獨活

防已

莽草

各升

水蛭

百枚

蜈蚣

三枚

蝨蟲

地膽

各十

右三十味諸蟲皆去足翅教炙令熟為散酒服方寸七日再其病入髮令髮白服之百日

歸酒服五分七日三〇又方 天麻 白鮮 黃芩 乾薑 附子 商陸 躑躅 右七味治下
五斗瘰

治白癩方 礬石 硫黃 等分 右二味為末醋和傅之〇又方 平旦以手掉取韭頭上露塗之極效

〇又方 取雞摩草者汁拭之亦指令傷過白汁塗之〇又方 石灰松脂酒主之秘方〇又方 以
蛇蛻皮熬摩數百過棄置草中〇又方 空樹中水洗以桂為末唾和塗之日三〇又方 以水銀數

數拭之令熱即消瘰乃止

治凡身諸處白皴漸漸長似癬不瘰方 取鰻鱧魚脂塗之先指病上使痛然後塗之〇又方 炙左右

手中指節去延外宛中三壯未瘰報之

〔行義〕九江散中類集祛風破血散結辟毒諸藥為白癩風之專藥風毒入髮令人髮白服之百日還

黑豈非風毒去而氣血復之一驗歟 又方 以雄黃乾薑散結白斂黃芩解毒商陸躑躅破水味雖

簡略而功力較前方不殊 礬石硫黃辟除陰毒 韭頭上露滋燥散血 蘿摩指拭祛風與堅 石

灰松脂通痹逐溼 蛇蛻專於祛風 桂末力能散血 水銀殺蟲拔毒 鰻鱧脂亦能化蟲兼可滋

血 治皮中紫赤疔瘰去腐穢方 乾漆 雌黃 礬石 略 三雄黃 五兩 巴豆 十五枚 炭皮 二斤 右六味治下

篩雞子白和塗故帛貼病上日二易

治赤疔方 用京墨大蒜血合塗之

治贅疔瘰方 雄黃 硫黃 珍珠 礬石 巴豆 簡如 菰蘆 略 右七味治下篩以真漆合和

如泥以塗點病上須成瘡及去面黔皮中紫不耐漆人不得用以雞子白和之

〔行義〕風毒入傷血分瘀滯薄於皮腠而成疔瘰者紫雲風也方用乾漆散血二黃辟毒礬石逐垢巴

豆破頑炭皮散火雞子解毒并和諸約之性 又以蒜穢通濁血消瘀墨即炭皮散火之義 贅疵
專須辟毒破頑真漆力倍乾漆不耐漆者仍以雞子白和之

去疣目方 松柏脂合和塗之一宿失矣○又方 以石硫黃指六七過○又方 以杏仁燒令黑研膏

塗上○又方 以猪脂瘰癧處指之令少許血出即瘥○又方 苦酒漬石灰六七日滴取汁點疣上小

作疣即落○又方 取牛口中涎數塗自落○又方 著艾炷疣目上灸之三壯即除

行義 松柏之脂並能燥溼 石硫黃辟除陰毒 杏仁灰專辟垢膩 猪脂滋燥解毒 苦酒漬石

灰善駁歹肉 牛口中涎滋化毒熱 總不若艾火最捷

惡疾大風第五論十首

論曰惡疾大風有多種不同初得雖通體無異而眉鬚已落有遍體已壞而眉鬚儼然有諸處不異好人
而四肢腹背有頑處重者手足十指已有墮落有患大寒而重衣不暖有尋常患熱不能暫涼有身體枯
槁者有津汗常不止者有身體乾癢徹骨搔之白皮如斂手下作瘡者外臺作痒不作瘡有瘡瘍荼毒重疊而生
晝夜苦痛不已者有直置頑鈍不知痛癢者其色亦有多種有青黃赤白黑光明枯暗此候雖種種狀貌
不同而難療易療皆在前人不由醫者何則此病一著無問賢愚皆難與語何則口順心違不受醫教直
希望藥力不能求已故難療易療屬在前人不關醫藥予嘗手療六百餘人瘡者十分有一莫不一一親
自撫養所以深細諳委之姑與其語覺難與語不受入即不須與療終有觸損病既不瘥乃勞而無功也
昔神仙傳有數十人皆因惡疾而致仙道何者皆由割棄塵累懷穎陽之風所以非止瘡病乃因禍而取
福故余所親病者其中頗有士大夫乃至有異種名人及遇斯患皆愛戀妻孥繫著心髓不能割捨直望
藥力未肯近求諸身若能絕其嗜慾斷其所好非但愈疾因茲亦可自致神仙余嘗問諸病人皆云自作
不仁之行久久並為極張之業於中仍欲更作云為雖有悔言而無悔心但能自新受師教命食進藥餌
何有不除余以貞觀年中將一病士入山教服松脂服至百日鬚眉皆生由此觀之惟須求之於已不可

皆自誤然斯疾雖大癰之於微亦可即瘥此疾一得達者不過十年皆死近者五六歲而亡然病者自謂百年不死深可悲悼一遇斯疾即須斷鹽常進松脂一切公私物務釋然皆棄猶如脫屣凡百口味皆須斷除漸漸斷殺不文俗事絕乎慶弔幽隱巖谷周年乃瘥瘥後終身慎房事犯之還發茲疾有吉凶二義得之修善即吉若還同俗類必是凶吳令略述其由致以示後之學者可覽而思焉

行義 治惡疾方 用細粒烏豆擇取厚之皮不落者取三月四月天雄烏頭齒及根淨去土勿洗搗取汁漬豆一宿漉去曝乾如此七番始堪服初服三枚漸加至六七枚日一服禁房室猶魚雞蒜身毛髮即生犯的不瘥

岐伯神聖散 治萬病癰疽癰疥癰風瘰癧骨肉疽敗百節痛眉毛髮落身體淫淫躍躍癰瘰目痛背爛耳聾齒齕痔瘻方 天雄 附子 茵芋 外臺 躑躅 細辛 烏頭 石南 乾薑 蜀椒 防風

白木 獨活 右十三味治下篩酒服方寸七日三勿增之

行義 驅除風毒之峻藥萃聚方中非岐伯不能創立非千金不能效用然惟形勝氣實邪正俱旺者為宜

狼毒散 治惡疾方 狼毒 秦艽 等分 右二味治下篩酒服方寸七日三服五十日愈

行義 狼毒殺蟲辟毒秦艽逐淫開痺免為癰風專藥

又方 煉松脂投冷水中二十通蜜丸服二丸遇饑即服之日三晝柱斷離者二百日服之瘥斷鹽及雜食房室又以天門冬酒服百日愈

行義 松脂祛風燥淫天冬酒服取其潤燥也

石灰酒 主生毛髮眉骨去大風方 石灰 水拌淫 松脂煉成 上麵 二料 黍米 一石

石四味

先於大鍋中炒石灰以木札者灰中火出為度以枸杞根剉五斗水一石五斗煮取九斗去滓以淋石灰三遍澄清以石灰汁和清麵用汁多少一如釀酒法訖封四七日開服常令酒氣相及為度百無所忌不得觸風其米泔及飯糟一事之上不得使人畜犬鼠食之皆令深埋却此酒九月作二月止恐膈上熱者服後進冷飯三五口壓之婦人不能飲食黃瘦積年及瘴風不過一石即瘥其松脂末初釀酒彈飯時均散著飯上待飯冷乃投之此酒飯宜冷不爾即醋宜知之

行義 石灰烈火煨出性最暴劣故本經治疽瘍瘡惡瘡痼疾死肌墮屑殺蟲去黑子息肉松脂慣患風霜背稟剛燥故本經治癰疽惡瘡頑瘍白禿配以枸杞根之甘寒本經有五內邪氣熱中消渴周痺風溼久服堅筋骨之治用以釀酒能生肩髮非去大風之明驗乎

治大風肩落亦白爛病八風十二痺筋急肢節緩弱飛尸遁症水腫癰疽疥癬惡瘡腳攣手折眼暗洞泄痰飲宿癖寒冷方 麵_{二十斤}商陸根_{二十斤}馬耳切 右三味合於甕中水一斛漬之炊黍米一石醱如

家法使麵米相淹三般單密封三七日開視麵浮酒熟澄清溫服三升輕者二升約發吐下為佳宜食軟煮飯牛羊鹿肉羹禁生冷醋滑及猪犬雞魚等

行義 前石灰酒治大風頑痺此商陸酒治大風溼爛方中馬耳恐是各耳之誤然惟血氣未傷形體浮腫可勝湯鍊者宜之

治風身體如蟲行方 用鹽一斗水一石煎減半澄清溫洗浴三四遍并療一切風○又方 以瀉灰汁洗面不過一月○又方 以大豆清飯漿水旦旦溫洗面洗頭髮不淨加少麵勿以水濯之不過十度

○又方 成煉雄黃松脂等分蜜和丸如梧子大飲下十九日三服百日愈慎酒肉鹽豉等

行義 鹽湯浴體取其導水 灰汁洗面取其逐溼 豆清漿水取其解毒 雄黃松脂燥溼通痺大

風惡疾之專藥也 孫真人千金要方行義卷二十三終

解毒雜治方凡八類

解毒毒論第一 論一首 方三十九首

論曰凡人跋涉山川不諳水土人畜飲啖誤中於毒素不知方多遭其斃豈非枉橫耶然而大聖久設其法以救活之正為貪生嗜樂忽而不學一朝逢遇便自甘心竟不識其所以今述神農黃帝解毒方法好事者可少留意焉

治諸食中毒方 飲黃龍湯及犀角汁無不治飲馬尿亦良

衍義 黃龍湯者坑廁中人尿汁也次飲以酒助之須臾毒隨瀉去大渴不可飲水飲水則毒不得解而難救矣 毒熱方張則以犀角磨汁飲之抱朴子云犀食百草之毒衆木之棘而能解毒者以其力能勝毒也馬屎辟穢殺蟲則毒從穢泄

治飲食中毒煩渴方 以苦參三兩咬咀以酒二升半煮取一升頓服取吐愈

衍義 苦參苦寒降泄故能解毒毒盛於裏者頓服取吐則煩滿隨吐而解

治食百物中毒方 掘廁傍地深一尺以水滿坑中取廁籌七枚燒令烟以投坑中乃取水汁飲四五升即愈急者不可得但掘地著水即取飲之○又方 服生韭汁數升○又方 含貝子一枚須臾吐食物差

衍義 毒盛於內而發熱氣逆者廁傍掘地攪水飲之其毒即解較之地漿最捷 生韭汁散血解毒口噤貝子聚涎沫含嗽以引食物上涌在上者因而越之也

治食六畜肉中毒方 各取六畜乾屎為末水服佳 若自死六畜肉毒水服黃柏末方寸匕須臾復與服佳○又方 燒小豆一升為末服方寸匕神良○又方 水服竈底黃土方寸匕

千金要方

卷二十四

衍義

借其所遺之穢以逐所中之毒須火發熱則以黃柏之苦寒泄之與前用苦參同意 小豆燒

未取投腎風 竈上水服取安土穢而攝毒邪也

治食生牛肉中毒方

掘地深三尺取下土三升以水五升煮土五六沸取上淨清者飲一升立愈

治食牛肉中毒方

狼牙燒灰水服方寸匕良一作猪牙又方 溫湯服猪脂良又方 水煮甘草汁飲

之

衍義

牛屬坤土肉最堅韌嘗見饒夫不待其熟乘生柔脆便食而致脹滿發熱但令掘地取土煮飲

以安坤土土為萬物之母萬物所歸無所復傳其毒自己 若中瘟疫牛毒則以狼牙燒服以本經專

主邪氣熱氣也 猪脂滑腸溫湯助泄則毒隨下解 甘草者飲總解諸毒

治食牛馬肉中毒方 飲人乳汁良

治食馬肉血洞下欲死方

豉二百粒杏仁二十粒

右二味咬咀蒸五升米下飯熟搗之再服令盡又方

飲盧根汁即解

治生食馬肝毒殺人方

牡鼠屎二十七枚而頭尖者是以水研飲之不瘥更作

治食野菜馬肝肉諸脯肉毒方

取頭垢如棗核大吞之起死人又方 燒狗屎灰水和絞取汁飲之

立愈又方 燒猪骨為末水服方寸匕

治食百獸肝中毒方 頓服猪脂一斤佳亦治陳肉毒

衍義

人乳通利腸胃推而廣之牛乳醍醐未嘗不通利解毒也 豉解毒毒杏仁泄氣救黑則因勢

利導陷胸丸中法也 盧根汁清利腸胃不但治食肉發熱并解河豚魚蟹諸毒 鼠屎專解陷入陰

分之毒 頭垢專解嘔逆滿膈上之毒 燒狗屎灰專解下焦脹閉之毒 燒猪骨灰專解中脘不納

之毒 猪脂頓服可使大便秘通而毒得下泄矣

中發熱口乾大渴之急發熱狂言舌醫或潤下方 杏仁一升合皮研以沸湯三

井和絞取汁分三服投肉完片皆出即安良驗

治食猪肉中毒方 燒猪屎為末水服方寸匕犬屎亦佳

治漏脯毒方 張文仲云茅室諸水造脯為漏脯 搗韭汁服之良大豆汁亦得

治鬱肉濕脯毒方 張文仲云內開在密器中經宿者為濕脯 燒狗屎為末水服方寸匕凡生肉熟肉皆不用深藏密蓋不泄

氣皆殺人又肉汁在器中密蓋氣不泄者亦殺人

治脯在黍米中毒方 陳麴一兩鹽二撮以水一升煮服之良

衍義 杏仁早散下氣以毒攻毒和皮研絞服之熱滿喘脹自除 食猪肉中傷則以猪屎燒灰治之

若食狗肉中傷合以狗屎燒灰治之中鬱肉毒亦不出此 漏脯鬱肉皆能致病漏脯毒傷在血故用

生韭搗汁 鬱肉熱傷於胃故用狗屎燒灰 脯在米中蘊毒陳麴煮服以消之借鹽之鹹引之下通

治牛肝諸脯毒及餅臠中毒方 取貝子為末水服如豆佳不瘥更服

人以雉肉作餅臠因食吐下治方 以犀角為末服方寸匕得安甚良

治食鵝鴨肉成病胸滿面赤不下食者方 服秫米泔良

衍義 貝子消堅故餅臠中堅勒毒物悉能消之 犀角總解腸胃諸毒故取治雉臠毒 秫米泔消

鴨肉過傷以其能逐胃中留積痰垢也

治食魚中毒方 煮橘皮停極冷飲之立驗 時後云治食魚中毒而腫煩亂者

治食魚中毒而腫煩亂及食鹽魚中毒欲死者方 剉蘆根春取汁多飲良并治蟹毒亦可取蘆葦茸汁飲

之

治食魚鱸及生肉在胸膈中不化吐之不出使成癥瘕方 厚朴 三兩 大黃 二兩 右二味以水二升煮

取一升頓服之

治食魚鱸不消方 大黃 三兩 朴硝 二兩 右二味以酒二升煮取一升頓服之 仲景有橘皮一兩時後方云治食肉過冷不消

三

要方 卷二十四

二

必成廢下之方亦無橘皮○又方 春馬鞭草飲汁一升即消生薑亦良附後方云亦宜服諸吐藥○又方 鮫魚皮燒灰水服無完皮以環刀裝取之一名鮫魚皮古今錄治食鮫魚傷身○又方 魚皮燒灰水服方寸匕○又方 魚鱗燒灰水服方寸匕食諸鮑魚中毒亦用之

治食蟹中毒方 冬瓜汁服二升冬瓜亦可食

衍義 諸魚皆助濕生痰令人熱中故以橘皮煎湯停冷服之使不上逆嘔吐 蘆根出自水中常通

魚鱗之氣且通利腸胃故專除魚蟹之毒 厚樸大黃破滯滌邪 大黃朴硝蕩練瘀積 馬鞭草功專散血 鮫魚皮專解魚毒 魚皮灰可消魚積 魚鱗灰利水消血 冬瓜汁利大小腸壓丹石毒

而中蟹毒亦取用之使從二腸解利毒便除矣

治食諸菜中毒方 甘草 貝齒 胡粉等分 右三味治下篩水服方寸匕小兒乳汁共服二升亦

好

治食樹菌中毒方 人尿汁服一升良

治食諸菌中毒方 掘地作坑以水沃中攪令濁澄清飲之名地漿

衍義 菜中之毒從蛇虺來以貝齒善治鬼疰蛇毒胡粉能治伏尸毒蟹甘草統治臟腑寒熱邪氣

菌毒用人尿汁者取其穢惡以除濕上浮長之毒也 用地漿者與解野葛毒義不殊也

解百藥毒第二篇一首 方十二首 解毒品味二十八條

論曰甘草解百藥毒如湯沃雪有同神妙有人中烏頭巴豆毒甘草入腹即定中藜蘆毒發瀉下咽便愈

中野葛毒土漿飲訖即止如此之事其驗如反掌要使人皆知之然人皆不肯學誠可嘆息方稱大豆汁

解百藥毒余每試之大懸絕不及甘草又能加之為甘豆湯其驗尤奇有人服玉壺丸治嘔不能已百藥

與之不止藍汁入口即定如此之事皆須知之此成規更不須試練也解毒方中條例極多若不出出一

二學者不可卒知餘方例簡

湯解毒以其專通上下陽氣不使陰毒濁惡侵犯真陽也 土漿解野葛毒其毒屬之邪無不從土而發無不從土而化 生大豆汁解百藥毒合甘草湯尤捷若大豆煮汁雖不致吐亦不能應手取效 藍汁解熱藥毒故服于壺丸嘔不能已者藍汁入口即定皆已試之驗餘方治例各有所主未遑逐一 瑣述

石藥毒用白鴨尿人尿汁 雄黃毒用防己 鐵粉毒用磁石 礞石毒用大豆汁白鵝屎

衍義 解一切石藥毒用白鴨尿人尿世本作人參礞石毒用大豆汁白鵝屎世本作白鵝骨皆刊刻之誤今正之

防葵毒用葵根汁 大戟毒用蔓蒲汁 桔梗毒用白粥 甘遂毒用大豆汁 躑躅毒用梔子汁 雞

子毒用醇醋 馬刀毒用清水 野芋毒用土漿人糞汁 杏仁毒用藍子汁 百藥毒用甘草薺尾大

小豆汁藍葉根實汁 金銀毒用水銀服數兩即出或雞子清及尿白燒猪脂和水淋雞屎汁

衍義 水銀質重入腹難出若非勢劇不可救治者難以輕試宜先以下法探之

芫花毒用防己防風甘草桂汁 野葛毒用雞子清葛根汁甘草汁鴨頭熱血猪骨雞屎人尿 藜蘆毒

用雄黃溫湯煮葱汁 烏頭天雄附子毒用大豆飴餠防風遠志棗肉 射罔毒用藍汁大小豆汁竹瀝

大麻子汁藕汁菱汁六畜血貝齒屑蚯蚓尿 半夏毒用生薑汁及煮乾薑汁 莨菪毒用薺尾甘草犀

角鱉汁升麻 狼毒毒用杏仁藍汁白飯鹽汁木占斯 巴豆霜毒用黃連煮汁大豆汁蔓蒲汁生薑汁

肘後云 煮寒水石汁 蜀椒毒用葵子汁蒜汁豉汁桂汁人尿冷水土漿雞毛燒吸烟及調水服 蟹螯

蜣青毒用猪骨或鹽大豆汁藍汁巴豆鹽湯煮猪骨 服藥過劑悶亂者用水和胡椒粉和葛粉地漿豉

汁覆荷汁杭米瀉乾薑黃連飴糖藍汁吞雞子黃 右解毒諸藥一例中有數味者但得一味即是不必

〔衍義〕藥之治病不得已耳病家不達斯理湯藥亂投每致眩暈當此欲圖挽回須詳究所誤之藥而施救解之法庶無復誤之失如過服風燥神氣浮散者胡粉以鎮固之過服傷津胃虛煩渴者葛粉以鼓舞之過服辛烈虛陽上逆者地漿以斂降之過服攻發虛煩懊懣者豉汁以清解之過服熱毒脹悶腹滿者藜蘆以泄利之過服攻伐中氣告匱者秬米瀉以調養之過服苦寒水穀艱進者乾薑以溫理之過服溫補壯熱昏亂者黃連以苦瀉之寒熱交錯煩擾厥逆者薑連並用以分解之過服助陽毒鬱斑黃者藍汁以消散之過服消起脾衰之氣者飴糖以溫養之過服傷陰陰乾煩痛者雞子黃以滋潤之過藥之患非止數端其餘諸例詳列如左未遑贅述

解一切毒藥發不問草石始覺即服此方 豉三升 生麥門冬 葱白 酪八 右三味以水七升煮取二升半分三服

雞腸草散 解諸毒方 雞腸草三分 薺尾 升麻 各四 芍藥 當歸 甘草 各二 全土一分 藍子一合

右八味治下節水服方寸匕多飲水為佳若為蜂蛇等毒蟲所螫以針刺螫上血出者藥如小豆許於瘡中令濕瘡若為射罔箭所中削竹如釵股長一尺五寸以綿纏繞水沾濕取藥內瘡中隨瘡深淺令至底止有好血出即休若服藥有毒水服方寸匕毒解痛止愈

解毒藥散方 薺尾一分 藍子二升 右二味七月七日取藍陰乾搗篩水服方寸匕日三 又方 取秦

燕毛二七枚燒灰服

解一切毒方 母猪尿水和服之又水三升三合和米粉飲之

解鴆毒及一切毒藥不止煩懣方 甘草 蜜 各四 梁米粉一升 右三味以水五升煮甘草取二升去

滓飲大熱內粉湯中攪勻調內蜜更煎令熟如薄粥適寒溫飲一升

治食毒若悶亂如卒中風或似熱盛狂病服藥即劇方 飲甘草汁藍青汁即愈

治野葛毒以死口噤者方 取青竹去兩節柱兩脇臍上內冷水注之暖即易須臾口開開即服藥立活

惟須數易水

治鈎吻毒困欲死面青口噤逆令身痺方

肘後方云鈎吻毒食芥相似而鈎吻所生之傍無他草又草有毛若人誤食之殺人

芫薺八兩咬咀

以水六升煮取三升冷如人體服五合日三夜二凡者薺芫惟令濃佳○又方 煮桂汁飲之○又方

噉葱涕佳諸毒治

治腹中有鐵方 白折炭刮取末以井花水服三錢不過再服

解五石毒第三論三首證十八條

論曰人不服石以慮事不佳惡瘡疥癬溫疫瘧疾年年常患寢食不安興居常惡非止以事不康生子難育所以石在身中萬事休泰要不可服五石也人年三十以上可服石藥若素肥充亦勿妄服四十以上必須服之五十以上三年可服一劑六十以上二年可服一劑七十以上一年可服一劑 又曰人年五十以上精華消歇服石猶得其力六十以上轉惡服石難得力所以常須服石令人手足溫煖骨髓充實能消生冷舉措輕便復耐寒暑不著諸病是以大須服之凡石皆熟煉用之凡石之發當必惡寒頭痛心悶發作有時狀如溫瘧但有此兆無過取冷水淋之得寒乃止一切冷食惟酒須溫其諸解法備如後說其發背疽腫方見二十卷中 又曰凡服石人慎不得雜食口味雖百品具陳終不用重食其肉諸雜饌重必有相賊積聚不消遂動諸石如法持心將攝得所石藥為無害不可加余年三十八九常服五六兩乳自是以來深深體患至於將息節度頗識其性養生之士宜留意詳焉然其乳石必須土地清白光潤羅紋鳥翻一切皆成白可入服其非土地者慎勿服之多致殺人其於鴆毒紫石白石極須外內映徹光淨皎然非爾亦不可服寒石五石更生散方舊設此藥方上古名賢無此漢末有何侯者行用自皇甫士安已降有進餌者無不發背解體而取顛覆余自有識性已來親見朝野仕人遭者不一所以宜食野葛不服五石明其有大大猛毒不可不慎也有識者遇此方即須焚之勿久留也今但錄主對以防先服者其方已從烟滅不復須存為念生害也

葱白豉湯 凡鍾乳對木又對枯萸其治主肺上通頭胸木動鍾乳胸塞短氣鍾乳動木頭痛目疼又鍾

乳雖不對海蛤海蛤能動鍾乳鍾乳動則目疼短氣有時木動鍾乳直頭痛胸塞然鍾乳與木為患不
過此也雖所患不同其治一也發動之始要有所由始覺體中有異與上患相應宜速服此方 葱白
半斤豉二升甘草三兩人參二兩外薑用 右四味先以水一斗五升煮葱白作湯澄取八升內藥煮

取三升分三服繞服使人按摩搖動口中嚼物然後仰臥覆以暖衣汗出去衣服湯熱歇即便冷三
飯燥脯而已若服此不解復服甘草湯

甘草湯方 甘草二兩桂心二兩豉一升葱白半斤 右四味合服如上法若服此已解肺家猶有客熱

餘氣復服生心湯

桂心湯方 桂心 麥門冬各三人參 甘草各二兩豉二升葱白半斤

右六味合服如前法 此方與用後散發身

湯分兩小異

〔衍義〕金石草木各有相反之毒但草木之性易過不似石藥之氣悍難解也此方專解鍾乳白木相

對之患鍾乳溫肺助陽白木溫胃滯氣肺胃同源兩溫相搏激動悍烈之性阻絕清氣之道致有胸塞
短氣頭痛目疼等證故取葱白之辛溫以通上下諸陽香豉以解胸中惡毒異氣甘草總解臟腑內外
諸毒人參助肺胃止氣則石藥之悍自可退聽即海蛤動乳乳動枯萸服此不解可用下法而為變通
可也 按藥對之治總解石藥之毒其間雖用硝黃多兼參耒者以病本虛寒故投峻烈雖有藥毒宜
攻又不得不以顧慮正氣為務也 前葱白香豉湯中用參專為病人元氣本虛而設若石藥之悍方
熾其人元氣本虛則寒折又難輕試乃於前方除去人參易入桂心而施從治之法庶無逆於病情服
此大勢已解尚有餘熱留於肺家并用二方參桂以調正氣更加麥門冬以清肺胃自客熱方得標本兼
濟之妙

杜仲湯 硫黃對防風又對細辛其治主脾腎通主腰脚防風動硫黃煩熱脚疼腰痛或嘔或泄無常或下

利不藥防風細辛能動硫黃而硫黃不能動後如骨節便服此方
杜仲 甘草 枳實 芍藥 桂心 附子 各一升 右六味合服如上法若不能解復服大麥奴湯

因脾腎兩虛而用硫黃峻補命門之火防風細辛為脾腎之引經然皆辛散上升所以能鼓動硫黃之毒而致煩熱下利腰痛脚疼皆脾腎兩傷之候故用杜仲堅筋骨枳實利五臟李核仁除煩熱甘草解諸毒香鼓散惡氣梔子仁導虛火乃借梔子鼓湯梔子甘草鼓湯枳實梔子鼓湯等方之法以治虛煩懊懷煩熱解而疏黃之毒渙散矣

大麥奴湯方 大麥奴四兩 甘草 人參 芒硝 桂心 略二麥門冬半斤 右六味合服如上法若服

已解脾腎猶有餘熱氣或冷復服人參湯

人參湯方 人參 乾薑 甘草 當歸 各一附子一枚 右六味合服如上法

行義 麥奴受濕土鬱蒸之氣而變癰黑為陽毒溫毒之專藥千金借以治硫黃之毒兼芒硝以蕩熱桂心以破結麥門冬以滋津人參以助正氣甘草以解毒也 若服麥奴丸熱勢已解正氣大傷而虛熱未除則當大理脾腎而用附子理中於中除去白木之滯氣而易當歸以和營也方下有言脾腎猶有餘熱或冷夫餘熱與冷冰炭懸殊此正千金藏機之奧也蓋餘熱即是假熱假熱即是真冷若果有餘熱其可漫投薑桂乎

生麥門冬湯 白石英對附子其治主胃通主脾腎附子動白石英煩熱腹脹白石英動附子嘔逆不得食或口噤不開或言語難手脚疼痛始覺宜服此湯方 生麥門冬四兩 甘草 麻黃 各三 豉 二升

右四味合服如上法不解再服大黃湯

行義 白石英入肺胃氣分附子溫補命門而通行十二經臟腑經絡無處不到是不能無發動之虞附子動白石英則煩熱腹脹白石英動附子則嘔逆不食故用麥門冬以解附子之烈麻黃以泄石英之悍甘草香鼓解毒除煩為門冬麻黃之匡佐合表裏而為開泄也

大黃湯方

若煩加細

大黃三兩 豉二升 甘草二兩 梔子仁枚十

右合服如上法頻服得下便止不下

服盡若熱勢未除視瞻高而患渴者復服枯薑根湯

枯薑根湯方

枯薑根

大麥奴各四兩

甘草二兩 豉二升 葱白半斤

右五味合服如上法稍稍一兩合

服之隱約得一升許便可食少應動口若已解胃中有餘熱復服芒硝湯

芒硝湯方

芒硝

桂仁各二兩

李核仁二十枚 白木一兩

大棗枚二十

甘草通草各三兩

右七味合服如上

法若腹脹去芒硝用人參二兩

衍義

前方用麻黃開發肺氣使白石英之毒從表而解服之不應必附子之烈盤錯於中故用大黃

開泄下焦使附子之毒從裏而解梔子佐甘草豉湯以解虛煩懊懣服後得下熱勢當平若仍高瞻煩

渴此裏熱解而表熱未除更以後方主之 枯薑根本經治消渴身熱大麥奴治陽毒斑黃甘草豉

引之從外而解 服後身熱雖解而煩熱腹脹不除則與芒硝湯蕩滌腸胃仍兼桂心杏仁甘草之類

更加通草利水道竅白木大棗滋培津氣以杜悍烈之復入而方後又有腹脹去芒硝加人參之例從

前既用大黃得下而脹此際豈可復用芒硝之蕩滌歟

人參湯

紫石英對人參其治主心肝通主腰脚人參動紫石英

外臺作細辛人參

心急而痛或驚悸不得眠卧

恍惚忘服大性發狂言欲眠或憤憤喜嘔或廢或劇乍寒乍熱或耳聾目暗又防風雖不動紫石英

人參能動防風

外臺云防風雖不對紫石英為藥中有人參緣防風動人參主發動令人心痛煩熱

令人頭項強始覺服此方

白木

各三兩

甘草

外臺桂心各二兩

細辛一兩 豉二升

右六味合服如上法若嘔盛加大黃黃芩梔子各

三兩若忘誤狂發猶未除復服後列第一生麥門冬湯

紫石英峻溫心肝血分之藥必其人氣血虛寒至劇故與人參同用因人參發動紫石英之悍所以有

心急恍惚等證且與防風同劑防風力薄雖不能如人參動紫石英而人參力雄勢必并動防風并發

之性然人參防風每常同用若不得紫石英亦無發動項強之患是皆人參動長石英所致若以人參

即真而用耗氣之味則石英之悍愈無所制故仍用參耆黃脾杜火辛桂通肝散結敗甘辟除毒則石英之性渙散無餘矣則葱白豉湯條下有云雖所患不同其治一也即人參發動防風亦不出此如服後噴盛則加大黃黃芩山桅以解肝家之蘊熱耳

生麥門冬湯方

外臺此方治麥石發

生麥門冬

葱白各半

甘草三兩人參一兩豉二升

右五味合服如上法

溫床煖覆床下著火口中嚼物使身稍汗一日便解若心有餘熱更服參桂湯

參桂湯方

人參 防風

甘草各三兩桂心二兩白朮

生薑各一兩

右六味合服如上法

〔衍義〕

前治白石英對附子生麥門冬湯方中用麻黃發越石藥之悍烈此紫石英對人參用人參葱

白以發越未盡之餘熱也

服生麥門冬湯溫覆取汗而餘熱未除即於人參湯中除去細辛香豉易

入防風生薑以解汗後表虛復入之微風詳服藥後溫床煖覆床下著火口中嚼物胃氣之虛寒可知

急需辛溫調適其宜庶免虛虛之患

大麥麴湯

赤石脂對桔梗其治主心通至胸背桔梗動石脂心痛寒嘔手足逆冷心中煩悶赤石脂動

桔梗則頭痛目赤身體壯熱始覺發宜溫清酒飲之隨能否須酒勢行則解亦可服此方 大麥熬令

汗出燥止勿令大焦春去皮細搗絹篩以冷水和服之

翼方云炒去皮淘淨蒸令熱曝乾熬令香為末

大麥熬令

〔衍義〕

赤石脂與桔梗原非毒烈之品能發動致病但石脂鬱遏桔梗升發之性氣不宣通所以心痛

逆冷桔梗激動石脂沉着之性氣不斂固所以頭痛壯熱始覺便宜飲酒以和中外并服麥麴以疏中

氣之滯也

葱白豉湯

礬石無所偏對其治主胃發則令人心急口噤骨節疼痛或節節生瘡始覺發即服此方

云服麥門冬湯

葱白半斤豉二升甘草二兩

右三味以水六升煮取二升半分三服若散發身體卒生瘡

宜服後方

生麥門冬湯方

生麥門

五兩

甘草

桂心

各二兩

人參一兩

葱白半斤豉一升

右六味服如解鍾乳湯

法

〔行義〕

按砒石雖無偏對而辛熱大毒傷胃令人心急其治與鍾乳對木之葱白豉湯解毒之意不殊但究其原彼因肺胃虛冷而用乳木故須人參此因腹中有瘕而用砒石但須三味足以解其毒可無藉於人參也 服散後身體生瘡此砒石之毒發外則用生麥門冬湯以滋肺胃之熱與紫石英對人參之生麥門冬湯但多桂心一味又與鍾乳對木之桂心湯藥味相同而分兩小異

木對鍾乳木發則頭痛目疼或舉身壯熱解如鍾乳法

附子對白石英亦對赤石脂附子發則嘔逆手脚疼體強骨節痛或項強面目滿腫發則飲酒服麩自愈若不愈與白石英同解

大黃黃芩湯

桔梗對赤石脂又對牡蠣又對茯苓桔梗發則頭痛目赤身體壯熱牡蠣發則四肢壯熱

心腹煩悶極渴解法並與赤石脂同茯苓發則壯熱煩悶宜服此方

白切鼓各一

右五味咬咀以水六升煮取二升半分三服

大黃 黃芩

各三兩 枳子仁兩

桔梗茯苓方常並用未聞有相對之患以劑中有石脂牡蠣滯其升降之氣而蘊熱故用大黃黃芩兼

枳子慈鼓以泄胸中虛煩之氣也

桔萸根湯

海蛤對桔萸海蛤先發則手足煩熱桔萸先發則噤寒清涕出宜服此方 桔萸根 甘草

各二兩

枳子仁十四枚

右四味合煎服如解鍾乳法

〔行義〕

海蛤桔萸亦無毒熱服之而煩熱口噤者良由病濕阻積為與所以仍用桔萸根引入先前誤藥受病之區統領大黃枳子開泄其邪乃金匱大黃甘草湯之變法

白石英發先腹脹後發熱

石硫黃發通身熱兼腰膝痛 砒石發遍身發熱兼口噤 牡蠣發則頭痛

煩熱 茯苓發直頭痛 桔梗發頭面熱 海蛤發心中發熱 蛤外宜浴 紫石英發乍寒乍熱 赤石脂發口噤身熱頭目赤記社

石硫黃砒石桔梗茯苓牡蠣此五物發隨

白石英亦可小浴其餘皆不

宜浴 礬石發宜用生熟湯 後發熱多攻頭即以冷水洗身清之

浴法 初熱先用煖水後用冷水浴時慎不可洗頭垂沐可二三升灌之凡藥宜浴便得解即佳如不瘥可餘治之

寒食散 發動者云草藥氣力易盡石性沉滯獨主胃中故令數發欲服之時以絹袋盛散一匕著四合酒中塞其口一宿後飲盡之其酒用多少將御節度自如舊法

衍義 寒食散即鍾乳散見十七卷肺臟氣極方中按腎臟門中寒食鍾乳散治例下云方在氣極篇中即鍾乳散方無寒食二字金匱雜療方中有紫石寒食散見千金翼

梔子鼓湯 治食宿飯陳臭肉及寒宿痰發者方 梔子三七枚 鼓三升 甘草二兩 右三味咬咀以水八升煮取三升分三服方可加人參葱白

葱白鼓湯 治因失食發及飲酒過醉發者方 葱白一斤 鼓一升 乾薑五兩 甘草二兩 右四味咬咀以水七升煮取三升分三服不解宜服

理中湯 人參 白朮 甘草各三兩 乾薑二兩 右四味咬咀以水六升煮取三升分三服人參湯 治因嗔怒太過發者方 人參 枳實 甘草各九兩 白朮 乾薑 桔梗根各六兩 右六味咬咀以水九升煮取三升分三服若短氣者稍稍數飲千金翼云主絞痛不得氣

衍義 梔子鼓湯為傷寒壞病虛煩懊憹之專藥此因宿食留滯而蘊發故兼甘草一味以助祛煩安

中之力 若過飢失食而虛煩或過飲醉發而嘔噦則宜葱白鼓湯藉甘草乾薑以安胃氣之逆也

胃氣本虛而宿食不化以理中湯為正治 因嗔怒而飲食留著蘊為痰涎又宜人參湯即枳實理中湯加桔梗根化熱安中可無短氣之患即散發氣逆心腹絞痛亦霍然矣

情色過多發宜服黃芪 衍義 詳肺臟氣極方中黃芪湯頗合此例現紉又腎臟補腎方中黃芪湯樂令黃芪湯並可選用

將冷太過發則多壯熱以冷水洗浴然後用生熟湯五六石灌之已食少煖食飲少熱酒行步自愈
將熱云過發則多心悶時時食少冷食若夏月大熱時發動多起於渴飲多所致水和少麴服之不瘥復
作以瘥為度

冷熱熨法 若大小便閉塞不通或淋瀝溺血陰中疼痛此是熱氣所致用此法即愈 其法先以冷物
熨小腹已次以熱物熨之又以冷物熨之若小便數此亦是取冷所為煖調理自愈

行義 上三法皆西北之人可用東南之人難以例推也

治藥發下利者方 乾服鼓即斷能多益佳

檳榔湯 凡服散之後忽身體浮腫多是取冷過所致治之方 檳榔三十枚搗以水八升煮取二升分

二服

行義 服辛熱石毒下利則以乾鼓解之 服藥後受冷藥停胃中身發浮腫則以檳榔湯利之

治丸散發瘡腫方 蔓菁子各一兩 杏仁 黃連 胡粉各一兩 水銀二兩 右五味別搗蔓菁子杏仁如膏以

猪脂合研令水銀減塗上日三夜一

治散發赤腫者方 生地黃五兩 大黃一兩 生商陸 杏仁四十枚 右四味切醋漬一切猪膏二升煎膏

陸令里去滓摩腫上日三夜一

治散發生細瘡者方 黃連 芒硝各五兩 右二味以水八升煮黃連取四升去滓內芒硝令煇清

布貼瘡上數數易換多少皆看之

治散發瘡痛不可忍方 冷石即滑石 三兩治下篩粉瘡上日五六度即燥煩更痛亦定

行義 藥毒發瘡毒已外達不須內治但與外傳可也

治服散忽發痛方 乾薑五兩以水五升煮取三升去滓內蜜一合和緩頓服不瘥重作

石藥毒漏於內而痛故用乾薑之辛以散之蜂蜜之甘以和之苦與寒折則愈滯不通矣

鴨通湯

解散除熱方

白鴨通

五升清湯二斗半

鼓

三升

麻黃

八兩

梔子仁

二十枚

石膏

五兩

冷石

二兩

右七味

五味

以鴨通汁

煮取六升

去滓

內鼓者

三沸

分服五合

若覺體冷

小便

快止後服若熱猶盛小便亦促服之不限五合宜小勞當漸進食不可令食少但勿使多耳

行義

鴨通利水取白以通金水二臟為解石毒之專藥佐以冷石石膏清解裏熱麻黃開泄表氣

子鼓甘解毒除煩兼通表裏惡毒真氣

解散

治盛熱實大小便赤方

升麻

大黃

黃連

黃柏

甘草

略

黃芩

四兩

芍藥

六兩

梔子仁

十四枚

竹葉

鼓

一白鴨通

五合

右十一味

以水三斗

先煮鴨通

竹葉

取一斗

二升

去滓

澄清

取一斗

次內藥煮取三升分三服若上氣者加杏仁五合腹滿加石膏三兩

彙取伊尹三王湯大黃黃連瀉心湯黃連解毒湯金花湯梔子鼓湯等方之製以解石藥內蘊之毒兼

取升麻之升散即鴨通湯中麻黃之義為藥甘草和營解毒竹葉鴨通清心利水引領諸藥從深道而

泄也

下散法

治藥發熱困方

莫方云凡散數發熱無賴下之之云諸丹及金石等同用之

黍米

三升

作糜

以成煎

豬脂

一斤

和令調

宿

不食且空腹食之令飽

晚當下

藥神良

不盡熱發

更合服之

○又方

肥豬肉

五斤

葱白

雞

各半

斤

治發動數數患熱困廉藥下之

右三味合煮治如食法宿不食且服之令盡不盡明日更服○又方

治發動數數患熱困廉藥下之

之方

以豬腎脂

一具

不令中水

以火炙承取汁適寒溫

一服三合每日夜五六服多至五六升二日

稍隨大便下○又方

作肥豬肉

臠

一斤

調如常法

平旦空腹頓服

令盡少時腹中雷鳴鳴定藥隨下

以器盛取用水淘石不盡更作如前服之

行義

黍米清胃熱豬脂解腎毒頓服令瀉則五石之毒咸得下奪矣其下豬肉葱雞炙豬腎汁

豬肉煮臠皆取下散腎毒總取血肉之性易通腸胃之毒耳

蠱毒第四論一首六條

方二十首

論曰蠱毒千種種種不同或下鮮血或好卧暗室不欲光明或心性反常乍嘔下喜或四肢沉重百節疲
疼狀貌說不可盡亦有得之三年乃死急者一月或百日即死其死時皆從九孔中或於脇下肉中出去
所以出門常須帶雄黃麝香神丹諸大辟惡藥則百蠱猶鬼狐狸老物精魅永不敢著人養生之家大須
慮此俗亦有灸法初中蠱於心下捺使大炷灸一百壯并主獨鬼亦灸得愈之當足小指尖上灸三壯常
有物出酒上得者有酒出飯上得者有飯出肉菜上得者有肉菜出即愈神驗皆於灸瘡上 凡中蠱毒
令人心腹絞痛如有物嚙或吐血皆如爛肉若不即治蝕人五臟盡乃死矣欲驗之法當令病人唾水
沉者是蠱不沉者非蠱也 凡人患積年時復大便秘如漆或堅或薄或微亦有是蠱也 凡人忽患下
血以斷下方治更增極者此是中蠱者也 凡卒患血痢或赤或黑無有多少此皆是蠱毒粗醫以斷痢
藥處之此大非也 世有拙醫見患蠱脹者遍身腫滿四肢如故小便不甚濇以水病治之延日服水藥
經五十餘日望得痊愈日復增加奄至殞歿如此者不一學者當細尋方意消息用之萬不失一醫方千
卷不盡其理所以不可一一備述 凡人中蠱有人行蠱毒以病人者若服藥知蠱主姓名當使呼喚將
去若欲知蠱主姓名者以敗鼓皮燒作末飲服方寸匕須臾自呼蠱主姓名者可與令去則愈又有以蛇
涎合作蠱藥者飲食中使人得痼病此一種積年乃死瘵之各自有藥江南山間人有此不可不信之
太上五蠱丸 治百蠱吐血傷中心腹結氣堅塞咽喉語聲不出短氣欲死飲食不下吐逆上氣去米無
常狀如鬼祟身體浮腫心悶煩疼寒戰夢與鬼狐狸作魅卒得心痛上又胸脇痛如刀刺經年累歲著
床不起悉主之方 雄黃 椒目 巴豆 莽草 芫花 珍珠 臺作木香 鬼臼 礬石 藜蘆 各四
附子五分 獺肝一分 蜈蚣二枚 蟻蛭三十枚 右十三味為末蜜和更搗二千杵丸如小豆先食飲服一
丸餘密封勿泄藥氣十九為一劑如不中病後日增一丸以下利為度當下蠱種種狀貌不可具述下
後七日將息服一劑三十年百病盡除忌五辛

南粵鬼蠱之鄉多畜百蟲互相啖食毒歸其一取以賊人謂之曰蠱蠱毒之患不一總皆鬼蠱陰謀故

治蠱之方多用陽藥如太上五蠱丸首取雄黃純陽之精佐以附子椒目破除陰毒以壯巴豆莽草鬼
曰芫花藜蘆礬石破癰疽堅積鬼瘡蠱毒之威癰肝蜈蚣蟹螯專殺尸症蠱毒真珠稟離方真火力破
五臟之百邪為五蠱首列之神方也

太乙追命丸

治百病若中惡氣心腹脹滿不得喘息心痛積聚臃腫疔瘕宿食不消吐逆嘔噦寒熱瘰

癧蠱毒婦人產後餘疾方

蜈蚣一枚丹砂即真附子礬石一作雄黃藜蘆鬼白各一巴豆二

分

右八味為末蜜丸如麻子一服二九日一服傷寒一二日服一丸當汗出綿裹兩丸塞兩耳中下

痢服一丸一丸塞下部蠱毒服二丸在外膏和厚病上在膈上吐在膈下利有瘡一丸塗之毒自出產
後餘疾服一丸耳聾綿裹塞耳中

此於五蠱丸中削去椒目莽草芫花癰肝蟹螯等味比之前方稍平而功力不殊并可以治傷寒瘰癧
者以其力能吐下外內宣通豁然汗出然此方僅施於藜蘆可也

治人得藥雜蠱方

蠱蠶六枚桂心藜蘆各如大釜月下土如彈大右四味治下篩水服一錢匕下蠱蛇

蝦蟇蛭螂毒俱出

行義 蠱毒治寒熱蠱症桂心破陰毒固結藜蘆涌膈上蠱毒釜下土辟水土二臟之陰邪不使蠱

藜蘆之毒留者也

萬病丸

治蠱症四肢浮腫肌膚消索欬逆腹大如水狀死後轉易家人一名鼓脹方小品名雄黃

巴豆

鬼白略同蜈蚣三枚右五味為末蜜和搗三千杵丸如小豆密封勿泄氣宿勿食平旦空腹

一丸一炊久不知更加一丸當先下清水次下蠱長數寸及下蛇又下鰕雞子或白如膏下後作散或

粥補之百種煖將息

五味總出五蠱丸中較之追命丸僅多莽草一味治蠱之大義可知

治中蠱母腹內堅如石面目青黃小便淋瀝病變無常處方

肘後古今錄陰俱云用鐵精烏雞肝和丸如梧子酒服三九日再甚者不過十日千金用

此湯殺羊皮方五 犀角 牡丹 黃連 一兩 薏苡根 四兩 梔子仁 七枚 右七味咬咀以水九升

煮取三升分三服 梔子有苦參并麻當歸

行義 腹堅如石面目青黃陰邪內結也小便淋瀝病變無常火毒攻注也故用犀角黃連清解毒熱

殺羊皮辟除不祥藥何專主蠱毒取其性毒而能攻毒也蠱者服薏苡并卧其葉即呼蠱姓名令其

傾去陰謀之毒害甚於此

犀角丸 治蠱毒百病腹暴痛飛尸惡氣腫方 犀角屑 鬼臼屑 桂心末 羚羊角屑 各四

莽草 真珠 砂 雄黃 各一貝子 五枚 蜈蚣 五節 巴豆 五十 射罔 各如雞子 右十三味為末

蜜丸如小豆服二丸日二含咽不知少增之卒得腹滿飛尸服如大豆許二丸若惡氣腫以苦酒和塗

上絳囊盛藥繫左臂辟不祥鬼疰蠱毒可以備急

行義 犀角丸中雄黃巴豆鬼臼莽草蜈蚣真珠等味皆五蠱丸中所用之藥天雄射罔即五蠱丸中

附子之義仁壽尤盛於羊角雖為平肝弛筋之品而本經主治有去惡血注下辟蠱毒惡鬼不祥之功

用與五蠱丸中獾肝同意其餘犀角解諸毒桂心破陰結貝子療尸疰麝香辟惡氣殺鬼精物去三蠱

蠱毒諸治也

治蠱毒方 薏苡根 薏苡根 各三

又方 蛭皮灰 亂髮灰 各一方 生麻子汁 五升 桃根皮 各一兩 楊柳樹北陰白皮 各五 右五味先煮

桃根柳皮取濃汁一升和麻子汁髮灰等令勻患人宿少食且服一大升須臾著盆中以雞翎搗吐水

中如牛涎續胎及諸毒並出○又方 柳樹北陰白皮一大握長五寸水三升者取一升空腹服即吐

蟲出亦治中蠱下血○又方 蛭皮灰水服方寸匕亦出蟲○又方 大戟 蟬蛻 五月五日桃白

皮 各四分 必效方云 右三味治下節且空腹以水一鍾服八粒用二指相著如開頓服之若指頭相

離取藥太過恐能損人用後方云服藥後大不虛十日更一服必效方云服半方寸匕其毒即

出不出更一服李仙州云若酒中得則以酒服若食中得則以飯服之

之專藥兼取向陰之赤龍皮向陽之桃根皮入生麻子汁和髮灰探吐以涌泄諸毒也 柳皮治惡瘡

蟲漏 蝟皮治五痔陰蝕均為蠱毒之單方 大戟蟬蟄桃根白皮蠱毒腹脹之峻藥

治蛇蠱方 蛇毒入菜果中食之令人得病名曰蛇蠱 大豆末以酒漬絞取汁服半升

治諸熱毒或蠱毒鼻中及口中出血醫所不治方取人尿犬七枚燒作火色置水中研之頓服即愈亦解

百毒時氣熱病之毒服極神驗

治蠱吐下血方 檉皮長一尺五寸蘆荻根如足大指五寸小 右二味咬咀以水二升煮取一升頓服極下

治中蠱下血日數十行者方 巴豆二七枚虻青 藜蘆 附子 礬石各一 右五味為末別治巴豆合

和相得以綿裹藥如大豆許內下部中三日瘥○又方 苦瓠一枚以水二升煮取一升稍稍服之當

下蠱及吐蝦蟆蚪之狀一月後乃盡附後方云用苦酒二升煮

衍義 大豆末酒漬絞汁必用生者取吐毒方得泄 屎灰大解諸毒不獨治蠱以穢惡之物治穢惡

之疾也 檉皮苦寒荻根甘寒善解腸胃諸毒非獨治蠱毒而執毒下利亦能療之 蠱毒下血日數

十行而胸腹無痛滿之患知毒不在裏而在下因取殺蟲利竅滌垢之藥者內下部因勢以利導之也

蠱毒腫脹如水腫狀審無虛證可用苦瓠下之

八物萬根湯 治下血狀如雞肝腹中攪痛難忍者方 茜根 升麻 犀角略三桔梗 黃柏 黃芩

略二地榆 白蘘荷各四 右八味咬咀以水九升煮取二升半分三服此蠱利血用之○又方 桔

梗 犀角等分 右二味為末酒服方寸匕日三不能自服攪口與之藥下心中當煩須臾自靜有頃下

服至七日止可食猪脾臟自補養治蠱下血如雞肝日夜不解欲死者皆可用

治腸蠱先下赤後下黃白沫連年不瘥者方 牛膝一兩搥散切以瀉清酒一升漬一宿平旦空腹服之

再服使愈

行義 蠱毒下血如雞肝急需清熱解毒方中萬根犀角專散毒血黃柏黃芩專散熱結升麻桔梗并散於上地榆義何解散於下不特為蠱毒下血之專方并可治熱毒血痢之要藥下血如雞肝則以犀角解散之胸腹如刀刺則以桔梗開發之治證如八物萬根湯須詳稟氣病氣之微甚而為取用可也 先下紫赤血後下黃白沫此血化為水水病名腸蠱年膝一味生搗漬酒服之以散惡血

北地太守酒

治萬病蠱毒風氣寒熱方

烏頭

甘草

芎藭

黃芩

桂心

藜蘆

附子

各四白

兩

白

兩

白

飲

桔梗

半夏

前胡

麥門冬

柏子仁

略六

右十三味

以酒

洗

以酒

洗

以酒

洗

以酒

洗

以酒

洗

以酒

藥以絹囊盛之沉於甕底酒熟去糟還取藥滓以青布袋盛沉著酒底泥封秋七日冬十日夏五日空腹服一合日三以知為度因藥有毒故以青布盛之服勿中止二十日大有病出其狀如漆五十日即愈愈婦人年五十被病連年腹中積聚冷熱不調時時切痛遠臍絞急上氣胸滿二十餘年服藥二七日所下四五升即愈又有女人病偏枯絕產服二十日吐黑物大如刀帶長三尺許即愈其年生子又有女人小得癰病服十八日出血二升半愈有人被杖崩血內瘀卧著九年服藥十三日出黑血二三升愈有人耳聾十七年服藥三十五日耳中出血三升耳中出黃水五升而愈古方云喜平二年北地太守臣光上然此偏主蠱毒有人中蠱毒者服無不愈極難瘥者不過二七日所有效莫不備出曾有女人年四十餘偏枯癰瘦不能起長卧牀枕耳聾一無所聞兩手不收已經三載余為合之遂得平復如舊有人中蠱毒而先患風眼服茵芋酒傷多吐出蠱數十枚遂愈何泥此酒而不下蠱也嘉其功効有異常方故具述焉

行義

方中調和血氣之品居多惟烏附祛風黎蘆利穀而本經有蠱毒之治佐以白飯桔梗半夏以助破結開痰之勢得力全在釀酒通行經絡方能兼療方後諸病不獨治蠱毒之用也

胡真漏液第五論一首

方十五首

論曰有天生胡臭有為人所染與者天生臭者難治為人所染者易治然須三年醋傳磨石散勿止并服五香丸乃可得瘥勿前一度傳藥即瘥正一傳時曾得一瘥且五香丸見前第六卷中凡胡臭人通忌食芸薹五辛治之終身不瘥

石灰散

治胡臭方

石灰一升

楓香一作丁香

薑陸香

青木香各二兩

礬石四兩

橘皮

陽起石各

兩

右八味治下篩以綿作褰子粗如指長四寸展取藥褰上以絹囊盛著腋下先以布指令痛然後

挾之

又方以三年苦酢和灰傳之

衍義

素稟腥臊遺氣注於肝臟而泄於腋下雖用辛香遠數諸藥終難拔除病根不得已而用石灰

壯火之餘列兼陽起石以破陰邪之固結配礬石之酸溫收斂囊盛挾之以辟穢惡之氣他如醋和灰

傳銅青醋熨水銀胡粉搗塗總取酸收穢惡之義

治胡臭方

辛夷 芎藭

細辛

杜衡

各本略二

右五味以咀以醇苦酒漬一宿煎取汁傳之欲

傳取臨時時以瘥為度

又方

青木香

附子

石灰略二

礬石半兩

右四味為散者粉中常粉

之

又方亦銅屑以酢和銀器中炒極熟布裏熨腋下冷復易

取一升洗腋下即以白苦鉢燒令烟出重之數數作用

又方辛夷 細辛 芎藭 青木香各四

右四味治下篩重竟粉之

又方馬齒莧一束搗碎以蜜和作團以絹袋盛之以泥紙裏厚半寸曝

乾以火燒熱破取更以少許蜜和使熱勿令冷先以生布指之夾藥腋下痛久忍之不能然後以手勒

兩臂

又方牛脂 胡粉等分 右二味煎令可丸塗腋下二宿即愈不過三劑

又方伏龍肝 六物散 治漏腋腋下及足心手掌陰下股裏常如汗濕者方 乾利杞根 乾薑各半 商陸根 胡粉 滑石各一 右件藥治下篩以苦酒少和塗當微汗出易衣復塗上不過三着便愈或一年復發復塗之

又方水銀 胡粉外塗作粉霜 右二味以面脂研和塗之良驗

石灰二升銀屑一作銅屑 右二味合和絹囊盛汗出粉之佳○又方 黃礬石燒令汁盡治為末以絹

袋盛粉之即瘥○又方 正旦以尿洗臍下神妙

脫肛第六方十三首 灸法三首

肛門主肺肺熱應肛門熱則閉塞大便不通腫縮生瘡銳通方 白蜜三升煎令燥冷水中調可得為丸

長六七寸內肛門中倒向上頭向下少時取烱斯須即通洩泄

豬肝散 肛門主大腸大腸寒應肛門寒則洩泄肛門滯出方 豬肝一斤燒黃連 阿膠 芍藥各三

艾葉一兩烏梅肉五兩 右六味治下篩溫清酒一升服方寸匕半日再服若不能酒與清白米飲亦

得○又方 磁石四兩桂心一尺蠟皮一枚 右三味治下篩飲服方寸匕日一服即縮慎舉動及急

帶衣斷房屋周年乃佳附脫方云治女人陰脫出外用蠟頭一枚為四味

行義 脫肛有氣虛下陷有燥熱閉塞有濕熱毒壅如蜜煎導專滋津血之燥 豬肝散專散瘀熱之

毒方中豬肝逐污血黃連燥濕熱阿膠苦艾和營祛風烏梅收斂津血○又方以磁石鎮攝真陰桂心

導最虛熱蠟皮專治五痔陰蝕千金脫肛內治僅出二方至於氣虛下陷絕氣治法東垣之補中血氣

庶為得之

壁土散 治肛門滯出方 故屋東壁土一升皂莢三挺各長一尺二寸 右二味先搗土為散挹粉肛門出處次

取皂莢炙煖更遞熨取入則止○又方 蠶頭 故敗府履底各一枚 右二味燒蠶頭搗為散傳肛門

滯出頭次將履底接入即不出矣○又方 女萎一升以器中燒坐上熏之即入

治脫肛方 蒲黃二兩以豬脂和傳肛上內之二三度愈

治腸隨肛出轉廣不可入方 生枯薑根為粉以豬脂膏溫塗隨手抑按自得縮入

治積冷利脫肛方 枳實一枚石上磨令滑澤鑽安柄塗塗令煖熨之冷更易取縮入止○又方 鐵

精粉內上按令入即愈

治脫肛歷年不愈方 生鑽三斤水二斗煮取五升去鑽以洗日再○又方 蟹頭一枚燒令煙黃治

作盾以傳肛門上進以手按之○又方 灸故麻履底按令入頓按令入永瘡

行義 脫肛外治不一各究其源而為取用方為合宜如銳通用蜜煎導滋燥通幽專假南陽成法其

壁土散用壁土皂莢收濕逐垢 螯頭履底上引收濕 女萎祛除內風 蒲黃解散瘀熱 枯棗根

排解濕熱 枳實尉散冷滯 鐵精鐵汁攝火導氣以散壅腫之熱也

灸法

病寒冷脫肛出灸臍中隨年壯 脫肛歷年不愈灸橫骨百壯 又灸龜尾七壯龜尾即後

瘰癧第七方十三首 灸法十首 證一條

治石瘰氣瘰癧瘰癧主瘰癧瘰癧等方 海藻 海蛤 龍膽 通草 昆布 礬石一作松蘿 麥麴四

分半夏二分 右九味治下節酒服方寸匕日三禁食猪魚五辛生菜諸難消之物十日知二十日愈

○又方 小麥麴一斗海藻一斤特生礬石十兩 右三味以三年米醋漬小麥麴曝乾各搗為散合

和服一方寸匕日四五服藥含極乃咽之禁薑五辛猪魚生菜大吹大讀誦大呌語等○又方 昆布

松蘿 海藻各三兩 海蛤 桂心 通草 白斂各二兩 右七味治下節服方寸匕日三○又方 海

藻 海蛤各三兩 昆布 半夏 土瓜根 松蘿各二兩 通草 白斂 龍膽各三兩 右九味治下節酒服

方寸匕日二不得作重用方○又方 昆布二兩洗切如指大醋漬含咽汁盡愈○又方 海藻一斤

作二小麥麴一斤 右二味以三年醋一升搜麴末曝乾往反醋盡合搗為散酒服方寸匕日三服忌

努力崔氏云療三

行義 五癭總由肝家濕熱留滯筋經之患故首取昆布海藻海蛤之鹹寒以散結利水龍膽之苦寒

以降泄滯氣通草之甘淡以通經利數礬石之辛烈以治寒熱風痺松蘿之苦甘以祛風疎肝麥麴之

甘溫以消食去滯半夏之辛散以開發痰氣服用酒者取其辛溫以流布經脈也 又方以陳醋漬麴

甘溫以消食去滯半夏之辛散以開發痰氣服用酒者取其辛溫以流布經脈也 又方以陳醋漬麴

收斂肝邪海藻專除癰癤結氣特生礬石力破堅 邪氣味雖簡略而力不減於前方也 第三方較
首方稍平於中除去龍膽礬石麥麴半夏易入桂心之辛溫以散結白斂之苦寒以散腫却無礬石之
辛烈耳 第四方中九味與首方同白斂與第三方同惟土瓜根苦寒散血通痺稍為不同 第五方
獨用醋漬昆布以斂癰氣之浮長 第六方專取麴佐海藻以散癰氣之固結即二小方中用昆藻之
藥堅不殊而醋麴之斂散迥異用法不可不辨

五癭丸方 海藻 海蛤 白斂 續斷 海藻 松蘿 桂心 蜀椒 倒挂草 半夏略一神麴三

兩羊膺百枚 右十二味治下節以牛羊髓脂為丸如梧子日服三九〇又方 取鹿膺以佳酒浸令

沒炙乾內酒中更炙令香含咽汁味盡更易盡十具愈

行義 方中舊蒲利竅海蛤消堅白斂散腫續斷營助海藻軟堅松蘿清風桂心透經買椒開痺半夏

潑垢神麴消滯樹中倒挂草絕經絡病根羊膺通喉管結氣丸用羊髓以滋肺腎伏臧之風五癭之治

備矣 鹿走腎脈膺通喉氣專取衝陽之功以散陰結之厄不假他藥惟藉酒製以行其力

陽腫散 治二三十年癭瘤及骨瘤石瘤肉瘤脂瘤膿瘤血瘤或魚肉大如杯杆升斗十年不瘥致有漏

潰令人骨消肉盡或堅或軟或潰令人驚悸寤寐不安身體痠痛愈而復發方 烏鰂 石硫黃略一

鍾乳 紫石英 白石英略二 丹參 三分 琥珀 附子 胡燕尿 太黃 乾薑略四 右十一味治

下節以韋囊盛勿泄氣若瘡濕即傳若瘡乾猪脂和傅日三四以乾為度若汁不盡至五劑十劑止華

令人不痛若不消如芒硝二兩佳

行義 硫黃鍾乳紫白石英皆悍烈之性助以薑附破陰為鰂丹參琥珀散結燕尿辟毒僅取大黃一

味以泄癭瘤之旺氣并解藥石之悍烈傳之不消更加芒硝以輔大黃破毒之威

治癭瘤方 昆布 桂心略一 逆流水柳鬚二兩 海藻 乾薑略二 羊膺七枚 右六味為末蜜丸如小

彈子大含一丸咽津

衍義

逆水柳鬚解毒散此方用之以搜經絡中毒根即五癭丸中倒挂草之意乾薑逐濕開痹即五癭丸中蜀椒之意昆布為癭瘤之專藥即五癭丸中海蛤之意海藻鹹寒佐以桂心之辛溫互司散結之權九用蜂蜜以滋肺胃傷殘之津借羊脂引入喉管以通氣也

又方 礬石 芎藭 當歸 大黃 黃連 黃芩 白飯 芍藥 二 吳茱萸 一分 右九味治下節

雞子黃和塗故細布上隨癭大小厚薄貼之乾則易著藥熟當作膿脂細細從孔中出須探膿血盡著生肉膏若膿不盡復起如故

行義 傳治之方首取礬石除垢白飯散結三黃祛熱芎歸芍藥和營吳茱萸止痛雞子黃滋血少加蜂蜜和塗則無乾燥之患也

生肉膏 治癰爛潰漏及金瘡百瘡方 當歸 附子 甘草 白芷 芎藭 二 雞白 二兩 生地黃 三

兩 右七味以咀以猪脂三升半煎白芷黃去滓稍以傳之日三 又方 狗屎臘雞子傳之去膿水

如前方說傳生肉膏取處方見前二十

衍義 生肉須用和血芎歸地黃為之必需血不溫則肉不生故又須附子協助浮長之功佐以白芷

解毒生肌雞白散氣消腫甘草為解毒生肌之首藥也

灸法

癭惡氣灸天府五十壯 千金翼云又灸胸堂百壯 癭上氣短氣灸肺雲門五十壯 癭勞氣灸衝陽隨年壯 癭氣

面腫灸通天五十壯 癭灸天衢三百壯橫三間寸灸之 又灸中封隨年壯 在兩足跟上 諸癭灸

肩髃左右相當宛宛處男左十八壯右十七壯女右十八壯左十七壯或再三取瘡止 又灸風池百

壯俠項兩邊 又灸兩耳後髮際二百壯 又灸頭衝 一作頭衝在伸兩手直向前令臂著頭對鼻所

注處灸之各隨年壯 千金翼一凡肉瘤勿治治則殺人慎之 不得針灸

陰癰第八 論二首 方二十五首

論曰癰有四種有腸癰卵癰氣癰水癰其腸癰卵癰難痊氣癰水癰鍼灸易治

治癰九方

蜘蛛蟻桃仁各五粒桂心

蒺藜子

地膚子

澤瀉

防風

五味子

橘皮

茯苓

防

葵

芍藥

牡丹皮

細辛

海藻

狐陰

一具

右十六味為末蜜丸如梧子大服十九稍加

至三十九

灸法

陰癰灸足大趾下理中十壯隨腫邊灸之

肘後方云灸足大趾第二節下橫文正中央五壯姚氏云足趾本三壯

男兒癰先將兒至確頭

祝之曰坐汝兒某甲陰囊癰故灸汝三七壯灸訖便牽小兒令確頭下向著囊縫當陰頭灸縫上七壯

即消已驗又炷獨管頭許大凡男癰當倚確軸以草伸置軸上齊陰頭前灸軸木上隨年壯

衍義一方通主四癰首取蜘蛛入肝以治畢丸之病金匱陰癰疝氣偏有大小時時上下者蜘蛛散

主之助以桂心為通肝之使千金并取狐陰之同氣相感引入陰囊受病之所囊入厥陰又須風藥佐

之蒺藜細辛皆治腎肝內風藥也腸癰由於血結血屬有形之滯治須散血為主桃仁牡丹芍藥皆佐

桂心血藥也血結之久多化為水故又須防葵以散之水癰之治利水為主茯苓澤瀉地膚子皆利水

藥水病亦須風藥故用防風風藥能勝水濕之氣也氣癰不獨氣滯每兼水氣助虐雖用橘皮散氣須

兼海藻燕堅又恐下水傷陰即以五味子收斂陰津去除痼疾故云難療氣癰水癰雖云易治亦須鍼

灸助之

論曰有人自少至長陰下常有乾癬者宜依癰方主之有五勞七傷而得陰下瘡濕搔之黃汁出者宜用

補丸散主之仍須傳藥治之亦有患如精瘡者必如精方治之夫如精瘡者男子在陰頭即下婦人在玉

門內並似瘡瘡作白齋食之大痛瘡即不痛也

瘡瘡子湯治虛熱石藥發熱當露卧冷濕傷肌熱聚在裏變成熟及水病腫滿腹大氣急大小便不利

腫如皮紙盛水晃晃如老雞色陰莖堅腫為瘡水出此皆腎熱虛損強取風陰濕傷脾胃故也治之

治陰痛方 甘草末石蜜等分 右二味和乳塗之

行義

宗筋卒痛如刺血病無疑此必竭傷筋筋虛不能護持津液故汗出如雨倉卒不能措處急以三根活血止痛之味合燒酒灌熱地以氣熏蒸俟痛定汗止然後調治本虛此標本緩急之次第也

次方無汗出如雨見證本輕但取甘緩以滋血氣較之前方緩急天淵

治妒精瘡方

用銀釵綿裹以臘月猪脂熏黃火上煖以釵烙瘡上令熱取乾槐枝燒諸塗之○又方

麝香 黃礬 青礬等分

治陰蝕瘡方

蒲黃一升水銀一兩 右三味為末小便後傳上不過三度 右二味研成粉小便後即傳之瘡止○又方 狼牙兩把切以水

五升煮取一升溫洗之日五度○又方 肥猪肉五斤水三斗者令極爛去肉以湯令極熱便以漬瘡

中冷即愈

治陰蝕生瘡或瘡方

雄黃 礬石各二兩麝香半分 右三味為末粉瘡上即瘡

治陰惡瘡方

蜜煎甘草末塗之葛氏云此見有人患莖頭腫攻下瘡瘡欲斷者以猪肉湯漬洗之并黃柏黃連末塗之

治男女陰瘡方

石硫黃為末以傳瘡上

治男女陰瘡生瘡方

嚼胡麻傳之佳


治陰下生瘡洗湯方

地榆 黃柏各半 右二味以水一斗五升煮取六升去滓適冷煖便洗瘡

日再或只煮黃柏汁洗亦佳

行義

妒精瘡皆淫火之毒乘虛直犯髓藏熾發癰瘡庸工每用銀粉劫截最速久久結成癰毒為患巨測千金用水銀於外治方中略無妨礙良非內服之比其用重黃礬石麝硫黃柏以除濕腫槐蒲黃胡麻猪脂以滋疼癢二者兼見則參合而為取裁成法具在足以為繩墨也



5957c

1915

V. 2 no. 23-24